

# DESCRIPTIONS

DE  
COLÉOPTÈRES DE L'INDO-CHINE

Par M. LÉON FAIRMAIRE, Membre honoraire.

---

Séance du 28 mars 1888.

---

Diverses communications, faites d'abord par notre collègue M. Dollé, qui m'a envoyé les récoltes faites en Cochinchine par M. Laligant, puis d'autres de M. Maurice Aubert, de M. Fleutiaux, et surtout celles de notre collègue M. de Beauchène, qui a exploré avec succès le Tonkin, me donnent occasion de décrire un assez grand nombre de Coléoptères nouveaux ou intéressants.

La faune coléoptérique de cette région n'a pas un caractère bien tranché ; elle participe des faunes chinoise et malaisienne. En remontant vers les montagnes, on rencontre quelques types de l'Assam et de l'Inde ; mais, jusqu'à présent, les explorations dans les parties éloignées du littoral n'ont eu lieu que d'une manière rapide et superficielle, généralement dans des rayons restreints et souvent en courant de sérieux dangers.

*OPHIONEA BEAUCHENII.* — Long. 6 1/2 mill. — Elongata, convexa, nitidissima, atro-cœrulea, capitis prothoracisque collo, elytrorum tertia parte basali, mandibulis et antennarum articulis 3 primis (ceteris fuscis) rufis, palpis piceis, femorum basi pallida, elytris utrinque ante apicem macula minuta albida signatis ; capite polito, utrinque inter antennas sat fortiter impresso ; antennis gracilibus medium corporis paulo superantibus ; prothorace elongato, basi constricto, antice attenuato, ante apicem anguste cylindrico, basi transversim multistriato ; elytris medio leviter ampliatis, ante medium transversim impressis, apice paulo oblique truncatis et angustissime pallido marginatis, dorso lœvigatis, pilis erectis laxe sparsutis, suturam versus leviter bistriatis ; subtus fusco-cœrulea, collo et metasterno exceptis, tibiis tarsisque pallide ful-

vis. tibiarum et articulorum apicibus breviter fuscatis. — Tonkin (de Beauchêne).

Cette charmante espèce se distingue facilement de ses congénères par la coloration des élytres qui sont d'un bleu foncé avec la base rongeâtre et un point blanc sur chacune avant l'extrémité; en outre, il n'y a de stries que vers la suture.

**1. CASNONIA FUSCIPENNIS** Chaud. — Long. 6 mill. — Sat elongata, sat convexa, fusca, valde nitida, vage metallescens. elytris apice utrinque macula rufo-testacea aut fere integra, aut obsolete biloba, pedibus palpis rufo-testaceis, his apice infuscatis, genibus breviter obscurioribus, antennis fuscis, basi rufo-testacea; capite ovato, inter oculos, sat fortiter punctato, inter antenas fortiter bifoveato, clypeo utrinque angulato; prothorace oblongo-ovato, elytris angustiore, antee attenuato, postice leviter ampliato, parum dense punctato, lateribus fortius et rugose, fere plicatulo; elytris parallelis, apice paulo oblique truncatis, sat fortiter punctato-striatis, striis post medium attenuatis, apice evanescentibus, intervallis brevibus, basi subconvexis, post scutellum transversim impressis, intervallo 3° medio et ante apicem puncto impresso; pectore punctato. — Tonkin (Dorr et de Beauchêne).

**2. C. METALLICA.** — Long. 7 1/2 mill. — Praecedenti affinis sed paulo major, elytris longioribus; fusco-ænea, valde nitida. elytris apice extremo piceis, pedibus antennarumque basi rufo-testaceis, his fuscis, palpis rufo-testaceis, articulis 2 ultimis infuscatis; capite ovato, laevi, prope oculos longitudinaliter impresso; prothorace oblongo, capite angustiore, medio ampliato, basi transversim impresso et punctato, sulco medio subtilissimo; elytris minus parallelis, apice sinuato-truncatis, angulo externo evidentiore, dorso substriatopunctatis, punctis basi sat grossis, medio minoribus, ante apicem cum striis oblitteratis, intervallis planis, basi vix convexiusculis. post scutellum transversim obsolete impressis, sutura basi paulo depressa, stria 2<sup>a</sup> post medium punctis majoribus aliquot impressa. — Tonkin (Laligant).

La coloration est plus bronzée que chez l'espèce précédente, la tête n'est pas ponctuée entre les yeux, le corselet est plus étroit, plus rétréci à la base, non ponctué sur le disque. les élytres sont plus longues et leur troncature est un peu sinuée en dehors, ce qui rend l'angle externe plus marqué.

**PELIOCYPAS UNIFORMIS.** — Long. 4 1/2 mill. — Oblongo-elongatus,

paulo convexus, fulvo-testaceus, nitidus, elytrorum sutura et vitta submarginali vage obscurioribus, capite prothoraceque paulo magis rufescens; capite polito; prothorace latitudine haud latoire, basi elytris duplo angustiore, postice angustato, lateribus ante basin leviter sinuatis, angulis posticis paulo elevatis, rectis extus paulo productis, apice puncto setigero signatis, basi utrinque ad angulos obliquata, dorso convexiusculo, subtilissime transversimi strigosulo, medio sat profunde sulcato; elytris sat parallelis, sed postice paulo ampliatis, apice oblique truncatis, sat fortiter striatis, striis fere levibus, intervallis fere planis, stria 3<sup>a</sup> ante medium et intervallo 3° ante apicem puncto sat grosso signatis. — Tonkin (de Beauchêne).

Cette espèce se distingue de ses congénères par ses élytres presque unicolores, n'ayant que des traces peu distinctes d'une bande suturale et une bande submarginale plus foncées, parfois effacées. Les autres espèces ont la suture et une bande plus ou moins transversale d'un brun assez foncé; leur taille est aussi plus faible.

Ces insectes ressemblent beaucoup aux *Demetrias*; ils en diffèrent par le dernier article des palpes labiaux tronqué et les paraglosses dépassant beaucoup la languette.

*APRISTUS ÆNEIPENNIS* Schmitt, Goeb. Col. Birm., 37 (*Lionychus*). — Niger, supra æneus, sericeo-nicans; thorace subcordato, transverso, basi truncato, angulis posticis rectis; elytris striatis, antennis pedibusque brunneis. — Tonkin (de Beauchêne).

Cet insecte ressemble beaucoup à l'*A. æreus* Motsch., d'Algérie; il en diffère par la teinte plus soyeuse, notamment sur la tête et le corselet.

*PSEUDOZENA SPISSICORNIS*. — Long. 40 mill. — Sat elongata, subparallela, fusca, nitida, subtus cum pedibus piceo-rufescens, genibus tarsisque obscurioribus; capite prothorace valde angustiore, subtilissime punctulato, inter oculos sat fortiter biimpresso, tuberculo pone-oculari nullo; antennis brevibus, prothoracis basin haud attingentibus, crassis, apicem versus crassioribus et compressis; prothorace valde transverso, lateribus postice leviter sinuatis, margine postico recto, ante angulis paulo obliquato, his acutiusculis, dorso alutaceo, basi fortiter, antice minus transversim impresso; elytris fere parallelis, ad humeros sat acute angulatis, apice rotundatis, ante apicem sinuatis et plicatis, dorso striatis, intervallis convexiusculis 3° 5° que costulatis. — Laos (coll. du Muséum).

Distinct de ses congénères par sa taille bien plus faible et surtout par

ses antennes courtes et épaisses et sa tête bien plus étroite que le corselet, avec les saillies juxta-oculaires tout à fait nulles ; le pli marginal des élytres est aussi bien moins marqué.

*CALLISTUS MODESTUS* Schaum. — Long. 4 mill. — Opacus, capite cæruleo nitido, ore antennarumque basi pallide fulvis, prothorace rufo, elytris flavo-rufis, utrinque macula magna triangulari, et apice macula magna communis nigra, his maculis a vitta obliqua pallida separatis, margine externo anguste pallido, antice dilatato, striga humerali fusca, et puncto apicali pallido, antennis fuscis, articulis 2 primis exceptis, abdomine infuscatis, pedibus pallidis, femoribus rufescens, genibus breviter fuscis ; capite lateribus et summo fortiter punctato, disco polito, medio puncto signato ; prothorace breviter cordato, fere rugosulo, medio striato ; elytris fortiter punctato-striatis, intervallis convexis, pubescentibus. — Tonkin (de Beauchène).

Il m'a paru utile de refaire la description de cet insecte, car Schaum n'a dû avoir sous les yeux qu'un individu assez défloré ; aussi il n'indique pas les grande taches noires des élytres comme séparées entre elles et du bord par une étroite bande pâle qui s'élargit en avant et est précédée d'un trait brun sur l'épaule ; la tête est franchement bleue et les antennes n'ont que les deux premiers articles pâles.

*EPICOSMUS MANDARINUS* Schaum. — Cet insecte, découvert primitive-ment à Hong-Kong, a été retrouvé au Tonkin par M. de Beauchène.

*ABACETUS ÆNIGMA* Chaud. — Cet insecte de Hong-Kong se trouve aussi au Tonkin.

*BEROSUS ACUTISPINA*. — Long. 4 à 5 mill. — Oblongus, valde convexus, sat pallide fulvus, nitidus, capite maculis 2 verticis et prothoracis disco plus minusve vage rufo-brunnescentibus, elytris striolis brevibus fuscis in striarum fundo sitis, ad humeros, extus versus me-dium et disco ante apicem ; capite subtilissime dense punctulato ; prothorace longitudine duplo latiore, lateribus sat rotundato, antice vix magis quam antice angustato, margine postico utrinque late leviter sinuato, angulis obtuse rotundatis, dorso subtiliter dense punctulato, angulis anticis rotundatis ; scutello acuto, punctato, lateribus anguste lœvibus ; elytris oblongis, medio vix ampliatis, post medium angustatis, apice oblique truncatis et extus spina acuta sat longa armatis, angulo suturali paulo acuto, dorso punctato-striatis, intervallis planis, subtiliter sat dense punctulatis. — Tonkin (de Beauchène et Laligant).

Cette espèce ressemble, pour la forme générale et la coloration, au *B. sticticus* Fairm., d'Australie; mais il est remarquable par l'épine aiguë qui termine chaque élytre en dehors.

**HYDROCHIUS LATITANS.** — Long. 2 mill. — Oblongus, postice leviter ampliatus, obscure aeneus, vix nitidulus, pedibus palpisque testaceis, his articulo ultimo apice infuscato, tarsorum articulo ultimo fusco; capite dense punctato, inter oculos rugoso; prothorace elytris angustiore, subquadrato, antice dilatato, angulis anticis fere rectis, dorso fortiter punctato, paulo inaequali, postice leviter biimpresso, angulis posticis obtusis; elytris ovato-oblongis, postice paulo ampliatis, apice fere truncatis, dorso grosse substriato-punctatis, sutura sat fortiter et utrinque intervallo 5° leviter elevatis. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble à l'*H. carinatus*, mais plus petit, un peu plus métallique, le corselet est élargi en avant avec les angles antérieurs plus marqués, les élytres sont un peu plus tronquées à l'extrémité et les intervalles ne sont pas relevés, sauf le cinquième qui est à peine plus saillant que les autres.

**LIMNICHUS TONKINEUS.** — Long. 1 à 1 1/2 mill. — Ovatus convexus, niger, sat nitidus, vase aenescens, subtiliter rufulo-pubescent; antennis fuscis, gracilibus, apicem versus haud crassioribus; capite prothoraceque dense vix perspicue punctulatis, hoc lateribus fere rectis, margine postico medio truncato et utrinque leviter sinuato; scutello triangulari, dense subtiliter punctulato; elytris densissime punctulatis; pedibus fuscis. — Tonkin (Laligant et de Beauchêne).

Forme et taille du *L. incanus*, mais plus brillant, à pubescence uniforme, moins grise, le bord postérieur du corselet plus largement tronqué au milieu, l'écusson plus large, moins acuminé, les élytres plus finement ponctuées et les antennes nullement épaissies à l'extrémité.

**STENELMIS TRISULCATUS.** — Long. 3 mill. — Oblongus, subparallelus, fuscus, pubes cinerea subtili densissime vestitus, prothorace magis nigro-velutino, margine antico anguste rufescente, capite fuso, antennis piceo-rufis, subtus cum tarsis picens, femoribus obscurioribus; capite alutaceo; prothorace elytris angustiore, latitudine paulo longiore, antice vix attenuato, dorso medio sat late canaliculato, utrinque postice sulco sinuato, medio extus ramoso, antice abbreviato impresso, angulis anticis productis, acutis, piceis, margine postico utrinque sat fortiter sinuato, angulis fere rectis; scutello obtuse ovato, planato; elytris sat

fortiter lineato-punctatis, punctis post 2/3 longitudinis oblitteratis, lineis subtiliter punctulatis et evidentioribus, intervallis planis, 6<sup>o</sup> carinulato. carinula postice ad intervallum octavum obliquata, ante apicem oblitterata, lineis 1<sup>a</sup> et 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> et 4<sup>a</sup> basi conjunctis et puncto majore signatis. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble beaucoup à notre *S. consobrinus*, mais plus grand et couvert d'un enduit pubescent très fin, très serré, qui lui donne un aspect velouté ; le corselet est plus élargi vers la base, moins arrondi sur les côtés, avec le sillon médian moins marqué, non élargi en avant ; les points des élytres sont plus gros vers la base et plus fins vers l'extrémité, et la fine carène du disque est plus distincte et plus arquée.

Ce serait la première espèce du genre signalée dans l'extrême Orient si M. von Schönfeld ne venait de décrire (Entomolog. Nachr., 1888, 193) le *S. foveicollis*, du Japon. — Long. 3 1/3 mill. — Elongatus, niger, antennis basi, unguiculis rufis, prothorace ante medium foveolato utrinque obsolete impresso, elytris punctato-striatis, interstitio 2<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup> 7<sup>o</sup> que carinatis.

Chez notre insecte, la taille est plus faible, le corselet est presque canaliculé au milieu, et les élytres n'ont que des lignes de points ne formant pas de stries, avec une seule carène sur chacune.

En outre, M. Reitter a décrit récemment deux *Stenelmis* de Sumatra (Leyden Museum, 1888, 213).

#### PACHYPARNUS, nov. gen.

Ce nouveau genre est très voisin des *Helichus* ; il s'en distingue par le prosternum et le mésosternum un peu moins larges, l'oreillette du deuxième article des antennes, les autres articles minces, serrés, presque pectinés ; le corselet n'a pas de stries latérales ; le prosternum est presque caréné entre les hanches et son extrémité est très pointue ; la saillie intercoxale n'est pas triangulaire ni large, mais assez étroite, avec l'extrémité obtuse ; enfin le labre n'est pas caché par l'épistome et le dernier article des palpes maxillaires est allongé.

P. TONKINEUS. — Long. 7 mill. — Oblongus, convexus, fuscus, nitidus, pube fulvescenti-cinerea tenui sat dense vestitus, supra subtiissime dense punctulatus ; oculis sat globosis, pubescentibus ; prothorace antice angustato, margine postico utrinque late sat fortiter sinuato, angulis posticis sat productis, anticis evidentibus ; scutello

latiuseulo, breviter pentagono ; elytris substriato-punctatis, striis suturam versus evideutioribus. — Tonkin (de Beauchêne).

La découverte de cet insecte est fort intéressante, car les espèces de cette famille sont presque inconnues dans l'extrême Orient.

Le facès de ce Parnide est celui d'un énorme *Parnus auriculatus*, avec la pubescence plus fine et simple et le corselet sans sillons latéraux.

**HETEROCERUS INFIMUS.** — Long. 3 mill. — Oblongus, modice convexus, pallide fulvus, capite labaque fuscis, fronte pallidiore, prothoracis disco obscuriore, elytrorum disco ante et post medium vase obscuratis subtiliter dense fulvo-pubescent, lateribus ciliatis, capite subtilissime coriaceo : antennis brevibus, apice infuscatis ; prothorace valde transverso, antice angustato, angulis posticis valde obtusis, basi utrinque obliquata ; elytris oblongis, postice angustatis et apice conjunctim sat obtuse rotundatis, subtilissime dense coriaceis, basi prope humeros impressis ; subtus cum pedibus paulo dilutior. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemblé à un individu peu coloré de *PII. flavidus* ; mais la taille est un peu plus forte, le corselet est plus largement obscurci sur tout le milieu et les angles postérieurs sont un peu moins marqués, les élytres paraissent un peu plus longues, leur sculpture plus fine et les taches nébuleuses encore moins distinctes.

**NIGIDIUS OXYOTUS.** — Long. 43 mill. — Oblongus, sat convexus, niger, nitidus ; capite transverso, prothorace sensim angustiore, grosse sat dense punctato, sinuoso dense ocellato-punctato et vitta clypeo laevi transversim signato, subarcuatim late impresso, utrinque transversim foveato, fovea fundo laeviore nitidiore, lateribus ad oculos leviter sinuatis et sub oculis sat acute triangularibus, mandibulis rugosulis, utrinque cornus intus arcuato armatis ; prothorace transverso, lateribus subparallelis, basi breviter angustato, angulis posticis obtuse rotundatis, anticis abrupte rotundatis, dorso inaequali, grosse punctato, medio multo tenuius et impressione oblonga, fortiter punctata signato, lateribus vase impressis, antice sat abrupte delivi, dense fortiter punctato et medio canaliculato, margine postico magis abrupte brevius declivi et dense punetato ; scutello oblongo, medio punctato ; elytris ad humeros dentatis et basi extus obsolete denticulatis, dorso valde costatis, interstitiis latis, punctis grossis fere transversis, parum transversis dense impressis ; subtus fortiter sat dense punctatus, metasterno medio et prosterno sub-

angulos anticos laevibus, hoc impresso; pedibus validis, tibiis anticis extus acute quinque dentatis. — Tonkin (de Beauchêne).

Bien distinct par sa tête plus étroite, à oreillettes juxta-oculaires très courtes et pointues, avec les angles antérieurs échancrés; le corselet est très ponctué, plus lisse au milieu, avec un sillon longitudinal ponctué et une impression très fortement ponctuée, au bord antérieur, presque partagée au milieu par une ligne élevée.

La figure du *N. distinctus* Parry, du Cambodge, conviendrait bien à cet insecte, mais la description me paraît trop différer. Ainsi, chez ce dernier, la fossette allongée du prothorax est lisse au lieu d'être fortement ponctuée; la description ne parle pas des deux impressions dorsales, elle indique les angles postérieurs comme sinués, tandis que les côtés sont simplement coupés obliquement avant les angles, qui sont presque arrondis; les angles antérieurs de la tête sont fortement échancrés, presque en angles droits, puis les côtés sont sinués près des yeux et fortement creusés, formant au-dessous une courte dent triangulaire; les tibias antérieurs ont cinq dents bien marquées au lieu de cinq ou six petits tubercles.

**HOPLIA AUROTINCTA.** — Long. 5 mill. — Ovata, modice convexa, fusca, parce fulvo-hirsutula, squamulis rotundis rufo-aurosis et pallide viridulo-auratis dense vestita, his in prothorace postice vittas breves 3 et in elytris maculas transversas per suturam coeuntes efficientibus; capite antice fere truncato, nudo et leviter reflexo; prothorace transverso, antice sat fortiter angustato, lateribus ante medium sat fortiter rotundatis, margine postico utrinque levissime sinuato, angulis obtusis; scutello triangulare; elytris medio vix ampliatis, basi, lateribus et disco postice obsolete impressis; pygidio scutiformi, fere plano; pedibus castaneis, parcus squamosis, tibiis anticis extus tridentatis, unguibus anterioribus apice fiscis. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble un peu à l'*H. elegantula*, mais bien plus courte et couverte d'écaillles d'un doré faiblement verdâtre, avec des taches peu arrêtées, formées d'écaillles rousses ou brunâtres, parfois indistinctes.

**PHYTALUS? LATERICOSTATUS.** — Long. 12 mill. — Ovato-oblongus, convexus, castaneus, nitidulus, capite, prothorace et elytris ad humeros extus obscurioribus setulis pallide fulvidis sat dense vestitus; capite dense et rugose punctato, dense setuloso, margine antico vix perspicue sinuato; prothorace longitudine duplo latiore, basi elytrorum basi haud angustiore, antice angustato, margine postico utrinque obsolete, sinuato,

angulis fere rectis, dorso fortiter ac dense rugosulo-punctato ; scutello similiter punctato, apice rotundato ; elytris medio sat fortiter ampliatis, apice parum rotundatis, dense ac fortiter punctato-rugosis, ad latera costula basi et apice abbreviata signatis, callo humerali sat elevato, levigato, callo postico minus punctato ; pygidio scutiformi, ruguloso-punctato ; subtus cum pedibus piceus, nitidior, fulvido-pallido pubescente, abdomine setosulo, ad latera densius et fere maculoso, pectore abdominique lateribus densius, medio grossius et fere rugoso punctatis ; tibiis anticus fortiter bidentatis, unguibus basi denticulo minuto munitis, apice fortiter arcuatis et bifidis, unguiculis acutis, supero paulo graciliore. — Tonkin (de Beauchêne).

Dans son Genera, III, p. 291, Lacordaire dit, à propos du genre *Brahmina*, qu'une des deux espèces comprises dans ce genre par M. Blanchard, ayant le front sans carènes, pourrait être reportée parmi les *Phytalus*, qui seraient ainsi représentés au Bengale comme le sont les *Ancylonycha*. L'insecte décrit ci-dessus me paraît pouvoir rentrer, au moins provisoirement, dans le même genre ; il en a le front caréné, les antennes de 40 articles et les crochets tarsiens fendus à l'extrémité ; mais ces derniers ont en outre une très petite dent à l'intérieur. Le faciès rappelle celui de quelques *Empecta* de Madagascar ; la sculpture et la vesture sont celles de la plupart des *Schizonycha*.

**APROSTerna PYGIDIALIS.** — Long. 45 mill. — *A. antiquæ* affinis sed paulo angustior, magis æneo-virescens, capite prothoraceque dense punctulatis, hoc angulis posterioribus magis acutis, lateribus fulvo marginato ; scutello punctato, medio impresso ; elytris dense punctato-rugosulis et costulis magis elevatis ; subtus fulva, levissime æneo-viridi micante, fulvo-villosa, pygidio fortius punctato, fulvo, viridi-æneo micante et medio macula triangulari æneo-viridi, tibiis tarsisque æneis, femoribus fulvis, unguibus anterioribus sat gracilibus, externo haud dilatato, apice bifido. — Tonkin (de Beauchêne).

Forme de l'*A. antiqua*, mais plus verdâtre, avec la tête et le corselet assez finement mais densément ponctués, ce dernier bordé latéralement de fauve, et les élytres finement et densément rugueuses, ce qui les rend un peu moins brillantes, avec les côtes plus saillantes, le pygidium plus nettement et plus densément ponctué, une grande tache triangulaire, d'un vert bronzé, au milieu ; les crochets des tarses antérieurs sont aussi très différents.

**ANOMALA BILUNATA.** — Long. 40 mill. — Ovata, postice paulo am-

pliata, sat fortiter convexa, fulva, nitida, elytris brunneo-fuscis, paulo ante medium macula aurata luniformi, ad suturam paulo interrupta, et macula subapicali fulvis, plus minusve lunata, capite fuso, antice piceo anguste marginato, sutura clypeali interdum anguste picea, tibiis apice extremo tarsisque piceis; capite dense punctato, fere rugosulo, margine antico arcuato et paulo reflexo; prothorace brevi, a basi antice arcuatim angustato, margine postico vix sensim hisinuato, angulis posticis sat acute rectis, dorso undique subtiliter marginato, sat dense punctulato, disco medio macula oblonga et lateribus utrinque maculis 2 obscuris, parum distinctis; scutello obtuse ogivali, piceo, punctato; elytris apice abrupte rotundatis, punctato-sulcatis, punctis sat grossis, densis, transversis, intervallis convexis, lœvibus, apice extremo planiusculis; subtus sat dense punctata, fere nuda, coxis 4 anticis contiguis, unguibus 4 primis minuscule apice breviter fisso. — Tonkin (de Beau-chêne).

La tache postérieure est parfois plus développée et occupe l'extrémité de l'élytre, rejoignant la tache de l'autre côté.

Cette *Anomala* se rapproche assez, pour la forme et la sculpture des élytres, de l'*A. arcuata* Gebl., mais le bord antérieur de la tête est plus arrondi, les stries des élytres sont plus fortement ponctuées, crénelées, les intervalles plus étroits, plus convexes; les hanches intermédiaires sont tout à fait contiguës. La coloration des élytres est en sens inverse: le croissant étant noir chez l'*arcuata* et fauve chez la *lunata*.

**POPILIA DILUTIPENNIS.** — Long. 6 mill. — Breviter ovata, capite, scutello prothoraceque viridi-metallicis, hoc lateribus dilute testaceo-fulvo, elytris dilute testaceo-fulvis, sutura anguste virescente, subtus cum pedibus viridi-metallica pectore dense albido-villoso, abdomen rufescente, basi præsertim viridi-micante, medio lœvi, lateribus sat dense albido-villoso, pygidio rufulo, valde viridi-micante, maculis duabus albo-pubescentibus ornato; capite subtiliter densissime punctulato, antice paulo opaculo, margine antico rufulo, leviter reflexo, ore anten-nisque rufulis; prothorace elytris paulo angustiore, parum transverse, antice rotundatim angustato, margine postico medio sinuato, utrinque obliquato, angulis posticis obtusis, dorso subtilissime sat dense punctulato; scutello sat lato, obtuse ogivali, basi punctulato; elytris sat brevibus, sat fortiter punctato-striatis, intervallis convexiusculis, lœvibus callo humerali oblongo sat convexo; pygidio subtiliter strigosulo-squamoso; pectore sat grosse punctato, pedibus anticis intus rufescentibus, tibiis valde bidentatis. — Tonkin.

Ressemble à la *P. quadriguttata* Fab., de Chine, mais beaucoup plus petite, à stries plus régulières, plus profondes, à intervalles égaux; en outre, l'écusson est moins arrondi à l'extrémité, le corselet est bordé de fauve et le pygidium est bien plus finement sculpté.

**SINGHALA CALLOSA.** — Long. 6 mill. — Ovata, antice attenuata, obscure ænea, nitida, elytris magis æneo-fuscis, utrinque macula ab humero suturam versus arcuata et fere medio macula transversa, interrupta rufis; capite dense ruguloso-punctato, subopaco, antice fere truncato, antennis fuscis; prothorace parum transverso, elytris paulo angustiore, antice post medium angustato, basi subtiliter marginata, ad scutellum recta, utrinque leviter sinuata, angulis posticis obtuse rectis, dorso sat tenuiter sat dense punctato, medio longitudinaliter anguste impresso, utrinque foveolis 2 signato; scutello lato, dense punctato, apice obtuse rotundato; elytris ante medium paulo ampliatis, apice separatim rotundatis, subtiliter striatis, striis leviter punctatis, basi paulo profundioribus, interdum convexiusculis, basi late impressis, callo postico magno, convexo; pygidio convexo, dense punctato, pedibus validis, tibiis anticis bidentatis. — Tonkin.

Var. *B.* — Elytris totis rufis.

Var. *C.* — Elytris totis fuscis.

Ressemble un peu à *S. tenella*, mais plus grand, à corselet moins court, avec les côtés presque parallèles, convergents seulement en avant, et la surface impressionnée; les élytres sont remarquables par le développement des callosités apicales et par les fortes impressions de la base. Leur coloration est extrêmement variable.

**VALGUS LALIGANTII.** — Long. 6 mill. — Ovatus, valde crassus, supra planatus, castaneo-brunneus, aut fuscus, sat nitidus, squamis ferrugineis plagiatis vestitus, prothorace elytrisque basi utrinque densius squamosis, fere penicillatis, hoc medio quadripenicillato; capite dense punctato inter oculos grosse squamoso, medio longitudinaliter impresso, margine apicali medio sinuato, fere bilobo; prothorace elytris valde angustiore, longitudine paulo latiore, antice sat abrupte angustato, lateribus antea fere angulatis et medio obsolete sinuatis, angulis posticis rotundatis, margine postico late rotundato, dorso reticulato-punctato et medio longitudinaliter impresso, utrinque arcuatim impresso; elytris brevibus, subquadratis, dorso depresso, striatulis, apice truncatis, sed

extus rotundatis, ad humeros paulo angulatis; pygidio ferrugineo-squamoso, medio penicillis 2 nigris signato; subtus reticulato-punctatus, squamosus, tibiis anterioribus extus fortiter tridentatis, evidentibus 2 intermediis minoribus signatis. — Tonkin (Laligant et de Beauchêne).

Voisin du *V. Vethi* Rits.; mais ce dernier a le corselet moins angulé, plus atténué en avant et le pygidium couvert d'écailles rousses, n'ayant pas les deux touffes de squamules noires de notre espèce.

**CÆNOCHILUS BIFOVEOLATUS.** — Long. 18 mill. — Oblongus, subparallelus, supra planatus et nigro-fuscus, nitidus, subtus cum pygidio femoribusque antice rufo-piceis; capite subquadrato, convexo, valde rugoso, inter oculos sat late biimpresso, margine antico late sinuato; prothorace convexo, transversim fere rotundato, dense fortiter punctato. lateribus subtiliter strigosulo, basi utrinque fovea subtiliter striolata impresso, linea dorsali longitudinali lœvi; scutello acutissimo sat dense punctato; elytris subparallelis, ad humeros et apicem rotundatis, dense sat subtiliter coriaceo-strigosulis, intervallis punctatis, sutura elevata fere polita, angulo suturali sat acuto, utrinque costis 2 parum elevatis, parce punctatis, prima basi dilatata et deplanata, 2<sup>a</sup> antice breviore, humeris oblonge elevatis; subtus cum pygidio piceo-castaneo, hoc convexo dense sat subtiliter coriaceo, rufo piloso; pectore coriaceo, dense rufo-villoso, abdomen parcus asperato-punctato et laxius villoso, utrinque stignato postico obtuse conico; pedibus strigoso-punctatis, femoribus cum pectore dense rufo-villosis, tibiis anterioribus apice extus compressis et dentibus 2 latis armatis, prosterno antice dente longo verticali vix arcuato, dense rufo-villoso signato. — Tonkin (de Beauchêne).

Ce *Cænochilus* est voisin des *javanicus* Westw., Mus. Oxon., 45, pl. XIII, fig. 9; mais il est plus brillant, le corselet, au milieu, est aussi large que les élytres, les angles antérieurs sont moins arrondis, la ligne médiane est très lisse, légèrement enfoncée à la base, les élytres n'ont pas de stries, mais des côtes; enfin le prosternum est armé en dessous d'une longue dent droite et velue.

**POLYCTESIS FOVEICOLLIS.** — Long. 15 mill. — Elongata, apice attenuata, sat crassa, sat convexa, supra viridi-metallica, lateribus paulo aureomicans, pube grisea subtili sat dense hirsutula, subtus cum pedibus cærulescens, prosterno medio magis cyaneo; capite dense punctato, antice paulo aurato, medio obsoletissime carinato, antennis sat brevibus,

articulis apicem versus, decrescentibus ; prothorace elytris haud angustiore, longitudine vix latiore, antice tantum angustato, lateribus postice parallelis, margine postico paulo incrassato, dorso fortiter dense punctato, postice sulco longitudinali medio abbreviato, sat profundo, basi foveato, basi utrinque fovea sat profunda impresso, his foveis tribus cyaneis ; scutello minuto, lœvi ; elytris post medium attenuatis et lateribus subtiliter serrulatis, dorso apice fere truncatis, denticulatis, dorso punctulato-striatis, striis apice profundioribus, intervallis planiusculis, sat dense sat fortiter punctulis, paulo rugosulis, sutura paulo elevata, lœviore et leviter cyanescente ; subtus dense punctata, pectore fortius.

— Cambodge (coll. du Muséum).

Resssemble extrêmement au *P. Rhoës*, d'Égypte et de Syrie ; en diffère par la taille notamment plus grande, le corps plus allongé, notamment les élytres, qui sont plus atténuerées en arrière, avec l'extrémité coupée moins obliquement ; le corselet est rétréci plus en avant, il présente à la base trois fossettes bien plus marquées, et les intervalles des stries des élytres sont plus ponctués ; la coloration est un peu plus dorée en dessus et plus bleuâtre en dessous.

**POLYCESTA TONKINEA.** — Long. 24 mill. — Oblonga, æneo-cuprea, sat nitida, maculis cæruleoscentibus sat irregulariter variegata, subtus cum pedibus cupreo-ænea, immaculata, griseo-pilosa, tarsis æneis ; capite dense punctato, inter oculos carioso, antice rugoso, fulvo-piloso, antennis æneis ; prothorace transverso, longitudine paulo latiore, lateribus antice valde rotundato, angulis posticis acutis, exsertis, margine postico ante angulos late sinuato, dorso grosse punctato, lateribus carioso, disco plagulis irregularibus politus sparsuto, basi media lœviore, sed subtilissime dense asperule, opaco ; scutello cæruleo, basi angusto, apice truncato ; elytris apice dentatis, dente primo paulo majore, dorso costatis, costa 1<sup>a</sup> medio abbreviata, 2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> que integris, ceteris postice tantum evidentioribus, intervallis profunde biseriatim foveolatis, intervallis elevatis, punctatis, foveolis extus plus minusve confluentibus ; subtus densissime punctato-rugulosa, medio lœvior, prosterno lateribus carioso, mediore lœviore, apice obtuse rotundato, segmento ventrali primo medio planato, lœviore, processu obtuso, fere truncato, segmento anali asperato, segmentis 2 primis lateribus plaga polita signatis. — Tonkin.

Cette espèce se distingue de la plupart de ses congénères par le corselet non angulé latéralement, seulement arrondi en avant, et sans impression longitudinale ; le faciès serait plutôt celui d'un *Psiloptera*.

POECILONOTA (LAMPRA) BEAUCHENII. — Long. 15 à 17 mill. — Oblonga, postice vix ampliata, viridi-metallica, nitida, interdum aurulento tincta, capite macula occipitali et prothorace maculis 3 aut 5 (media excepta) cœruleis nitidis, elytris macula subscutellari et utrinque maculis 7 atrocyaneis, abdomine lateribus cyaneo maculato, pedibus cœrulescentibus; capite paulo inæquali, summo sulcatulo et densius punctulato, antice grossius et parcus punctato et obsolete impresso; antennis fuscis, basi metallicis, prothorace elytris paulo angustiore, transverso, antice leviter angustato, margine postico utrinque late fortiter sinuato. angulis posticis sat acutis, dorso rugose punctato, paula inæquali, maculis lœvibus; scutello transverso, truncato, basi constricto, lœvi; elytris postice lateribus subtiliter serrulatis, dorso parum profunde striatis, striis laxe punctatis, suturam versus magis impressis, intervallis planis, transversim rugosis, punctatis, inaculis opacis; subtus dense rugoso-punctata. maculis lœvibus, prosterno lato, medio parcus punctato, inter coxas utrinque striato, apice obtuso, abdominalis segmento ultimo apice arcuatim emarginato. — Lien-Son, province de Sontay (de Beauchêne).

Cette belle espèce ressemble un peu au *P. virgata* Motsch.; mais elle est bien plus grande, plus brillante, la ponctuation est bien moins serrée et bien moins fine, les élytres ne sont pas marginées, le corselet est bien plus court, les intervalles des stries des élytres sont bien plus rugueux, l'écusson est lisse, brillant, vert ou doré, il n'y a pas de tache derrière l'écusson et l'abdomen a des taches bleues, sur les côtés.

1. CORÆBUS BEAUCHENII. — Long. 7 1/2 à 9 mill. — Oblongus, cœruleus, aut cœrulescenti-virens, nitidus, elytris vitta transversali fere mediana fusca, opaca, parte postica brunneo-aenescenti, parum nitida, dense albido-setulosa, apice obscuriore; capite parce punctato, profunde fere triangulariter excavato, medio dense albido-pubescente, lateribus angulatim productis; prothorace antice angustato, lateribus sat rotundatis, margine postico sat fortiter bisinuato, lobo medio parum producto, dorso antice valde convexo, postice transversim profunde impresso, impressione ad latera arcuatim prolongata. dense aspero-granulato; scutello majore, fere cordiformi ruguloso, depresso; elytris post medium levissime ampliatis, apice fere recte truncatis et utrinque bispinosis, spina externa paulo majore, margine externo ante apicem breviter ac subtilissime denticulato, basi late impressis, disco ante medium impressione minuta rotundata albido-pubescente signata et suturam versus longitudinaliter impresso; subtus cum pedibus fusco-aenescens, dense subtiliter rugosulus, dense albido-pubescentis. — Tonkin (de Beauchêne).

Bien distinct par ses élytres à troncature presque droite et biépineuse, par sa tête profondément creusée en triangle, avec les côtés relevés et fortement saillants en avant, son corselet très fortement convexe et ses élytres à bande transversale presque noire, la partie postérieure couverte d'une pubescence grise serrée qui la fait paraître mate.

Se rapproche, par la coloration des élytres, du *C. denticollis* Saund., mais ce dernier a les côtés du corselet denticulés et les élytres d'un violet foncé sans bande transversale noirâtre et dénudée.

Assez voisin du *C. Laportei* Saund (*spinosus* Lap.-Gory); mais, chez ce dernier, la coloration est fort différente et la troncature des élytres est sinuée, avec les deux épines égales.

2. *COREBUS INTRICATUS*. — Long. 10 mill. — Oblongus, nigro-cyanescens, sat nitidus, pilis griseis fasciatim variegatus et setulis aureis fasciatus; capite punctato, auro setosulo, valde cavato, utrinque ad oculos tuberculo nitidiore signato et supra antennarum basin transversim elevato; prothorace transverso, elytris haud angustiore, a medio antice angustato, margine postico utrinque valde sinuato, angulis obtusis, dorso parum punctato, medio elevato, postice transversim impresso, ad latera arcuatim impresso et carinula sat brevi arcuata signato; scutello laevi, triangulari, acuto; elytris post medium levissime ampliatis, postice angulatis, apice rotundatis et subtilissime denticulatis, dorso dense sat subtiliter punctato-asperulis, ad suturam longitudinaliter impressis, basi usque ad medium plagulis fere laevibus et nitidioribus, intervallis albido-setosulis, prope suturam et ad latera aureo setosulis post medium vitta transversa valde dentata denudata fere laevi, nitidiore, postice et antice vittula albido-setosula anguste marginata, postea plaga transversim migra, sat dense aureo-setosula, apice nigro vittula albido-setosula angulatim sinuata transversim signato; subtus rugosulo-punctatus, aureo-setosus. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble beaucoup au *C. undatus*, mais plus petit, avec la tête fortement excavée, bituberculée, le corselet moins angulé latéralement, fortement impressionné en travers à la base avec une petite carène latérale, et les élytres ayant de petits reliefs peu saillants, plus lisses, plus marqués, avec une large bande transversale, dénudée, après le milieu; les dessins en zigzag ont beaucoup de ressemblance, mais la pubescence dorée est remarquable.

3. *COREBUS SEMIPURPUREUS*. — Long. 19 1/2 mill. — Oblongus, cæruleus, nitidus, elytris plus minusve purpureo-violaceis, parte basali

minore cœrulea, lateribus, ad medium prolongata, maculis anticeis parum distinctis, postice vitta transversim areuata et apice albo-setosulis ; capite fortiter punctato, medio cavato, ad oculos obtuse tuberculato ; prothorace transverso, antice fere a basi angustato, lateribus basi rotundatis, dorso dense aspero-granulato, basi transversim, ad latera late, medio levissime impresso, disco medio obsolete carinato ; scutello æneo ; elytris fere medio levissime ampliatis postice attenuatis, apice sinuato truncatis, truncatura utrinque subtiliter denticulata et denticulo medio paulo majore, dorso rugosulo-punctato, punctis setigeris basi sat grossis, a medio postice gradatim obsolescentibus ; subtus dense rugosulo-punctulatus, griseo-pubescent. — Tonkin (de Beauchêne).

Ce joli insecte diffère du précédent par la coloration violette des élytres, cette couleur s'avançant, par la suture, jusqu'à l'écusson, et par l'absence d'une bande transversale sombre ; mais surtout par la tête qui n'est pas si profondément, ni triangulairement excavée, avec les tubercules peu saillants, par le corselet moins profondément impressionné à la base, à lobe médian moins saillant, et par les élytres terminées, non par deux petites épines simples, mais par de très petites denticulations dont la médiane est un peu plus saillante.

*AGRILUS SPLENDIDICOLLIS.* — Long. 41 mill. — Elongatus, postice attenuatus, æneo-metallicus, nitidus, capite prothoraceque cupreis ; capite antice late impresso, medio sulcatulo et inter oculos utrinque impressiusculo, dense reticulato-rugosulo ; antennis fusco-æneis, articulis 3 primis oblongis, 2° 3°que subæqualibus, 4-10 acute serratis ; prothorace transverso, antice haud sensim angustiore, lateribus arcuatis, basi brevissime rectis, margine postico utrinque sat fortiter sinuato, angulis acutiusculis, dorso dense transversim rugosulo-strigoso, basi triimpresso, impressione media majore, et lateribus medio late sat fortiter impresso ; scutello brevissime transverso, postice medio triangulariter producto ; elytris elongatis, medio vix sensim ampliatis, postice attenuatis, apice separatis rotundatis et subtiliter serrulatis, dense subtiliter rugosulo-squamosulis, basi utrinque late impressis, sutura et utrinque lineola (medio abbreviata) leviter elevatis ; subtus subtilissime pubescens, pectore rugosulo, prosterno fortiter transversim sulcato et margine antice late leviter sinuato ; abdomine subtiliter dense asperulo-punctato, basi et lateribus densius, segmento ultimo rarius et tenuius. — Tonkin.

Cet *Agrilus* ressemble au *sinuatus*, mais avec une coloration bien

plus brillante, cuivreuse sur le corselet, la tête bien plus fortement creusée et le corselet plus fortement striolé en travers.

**TRACHYS HYPOCRITA.** — Long. 3 1/2 mill. — Ovata postice attenuata, convexa, fusco-ænescens, sat nitida, pubes brevi sericeo-albida variegata, hac pubes medio prothoracis linea obtuse angulatam et in elytris medio et post medium vittulas valde angulatas transversim efficiente; capite convexiusculo, dense punctato; prothorace transverso, longitidine duplo latiore, a basi antice arcuatim angustato, margine postico fere recto, angulis posticis fere rectis, anticis valde deflexis, dorso densissime aequaliter punctato; scutello triangulari, cum margine elytrorum basali angusto polito; elytris fere a basi postice attenuatis, ante apicem, arcuatim angustatis, apice separatim obtusis, dorso dense rugulosopunctatis, punctis suturam versus, basi vase seriatis, margine externo bistriato, intervallo subcostato; subtus cum pedibus magis fusca, nitida, punctata. — Tonkin (de Beauchêne).

Le faciès de ce *Trachys* est un peu celui de certains *Attugenus*; la forme est plus convexe, la ponctuation uniforme et les fascies sont très nébuleuses.

#### ANTHRACALAUS, nov. gen.

L'*Alaus Westermanni* Cand. forme, au milieu de ce genre, dont toutes les espèces sont revêtues d'une pubescence plus ou moins marbrée, une anomalie qui ne permettait pas de l'y laisser. Cette absence absolue de vestiture, le brillant des téguments qui sont lisses, valent bien quelques légères modifications de pièces sur lesquelles nous basons des caractères génériques. On peut ajouter que les angles du corselet ne sont pas carénés, que les élytres ne sont pas tronquées et que le prosternum n'est pas sillonné transversalement en avant. Une deuxième espèce de Cochinchine présente le même caractère, et je lui donne le nom du regretté Dr Morice, duquel je l'avais obtenue au retour de son premier voyage.

**A. MORICI.** — Long. 33 mill. — Sat elongatus, sat convexus, postice leviter attenuatus, totus niger, valde nitidus, subtus magis nigro-piceus, segmentis ventralibus apice anguste piceo-rufescentibus; capite rugosopunctato, brevi, antice declivi et obtuse carinato; antennis compressis, basi prothoracis longe brevioribus, acute serratis, articulis 2<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>que minutis, 3<sup>o</sup> paulo longiore, ultimo appendiculato; prothorace latitudine

longiore, lateribus antice rotundato-angustatis, margine postico ad scutellum emarginato, utrinque valde sinuato, angulis posticis oblique pro-longatis, acutis, haud carinatis, dorso subtiliter, antice et prope angulos anteriores fortiter dense punctato; scutello convexo, quadrato, troncato clytris post medium attenuatis, apice obtuse acuminatis, sat subtiliter lineato-punctatis, lineis basi breviter striatis, intervallis subtilissime alutaceo-punctulatis; subtus dense punctatus, pectore fortius, prosterno antice haud transversim sulcato. — Cochinchine; a été retrouvé au Yunnan par M. Delavay.

**ALLOTRIUS SCULPTICOLLIS.** — Long. 49 mill. — Oblongo-elongatus, modice convexus, brunneo-fuscus, nitidus, fulvo-villosulus; capite brevi, rugoso-punctato, medio vage impresso; antennis brevibus, piecis; prothorace subquadrato, lateribus ad angulos antice rotundato, ad angulos posticos paulo latiore, his parum oblique retroversis, sat acutis dorso fortiter dense punctato, antice utrinque sat profunde et sat late sulcato, ad marginem anticum transversim depresso, angulis posticis carina sat prolongata signatis; scutello breviter ovato, apice rotundato, dense punctulato; elytris ad humeros sat rotundatis, postice angustatis, apice obtusis, punctato-striatis, striis dorso parum impressis, basi et lateribus profundioribus, intervallis planiusculis, dense punctulatis; subtus dense punctatus, prosterno fortius, apice prolongato et in fovea mesosterni recepto; pedibus piecis. — Tonkin.

Cette espèce ne ressemble guère au type du genre, qui est coloré de roux et de brun, avec les angles antérieurs du corselet pointus. La sculpture du corselet de notre espèce est assez remarquable.

**4. THROSCUS MEDIOCRISS.** — Long. 2 mill. — Oblongus postice attenuatus, sat convexus, piecus, nitidulus, pube grisea sat dense vestitus; capite paulo rufescente dense subtiliter punctato; prothorace transverso, antice angustato, lateribus antice arenatis, dense subtilissime punctato, margine postico medio obtuse angulato, utrinque valde sinuato, angulis posticis acutis, retroversis; scutello ogivali; elytris a basi postice attenuatis, apice conjunctis obtusis, sat subtiliter striatis, intervallis planis, punctulatis, pilis longioribus seriatis; subtus cum pedibus pieco-rufus, subtiliter dense griseo-sericans. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble au *T. proprius*, de l'Inde boréale, mais un peu plus petit, avec le corselet non élargi en arrière, mais se rétrécissant de la base en

avant, ayant le milieu du bord postérieur un peu plus saillant, et avec les élytres à stries lisses, les intervalles à pilosité disposée en séries.

2. *THROSCUS INFIMUS*. — Long. 4 1/2 mill. — *Præcedenti simillimus, sed minor et prothorace basi ad scutellum bifoveato, antice paulo magis angustato distinctus.* — Tonkin (de Beauchêne).

*EUBRIANAX MACULICOLLIS*. — Long. 2 4/2 mill. — *Ovatus, modice convexus, brunneus, sat nitidus. prothorace (macula antica brunnea excepta) ano pedibusque testaceo-fulvis, tibiis anterioribus obscuris; capite lato, oculis globosis, antennis fuliginosis, basi fulvescentibus, longe pectinatis, medium corporis fere attingentibus; prothorace elytris haud angustiore, longitudine duplo latiore, antice angustato, margine antico rotundato, caput obtegente, utrinque leviter sinuato, lateribus cum angulis posterioribus rotundatis, margine postico utrinque sinuato, medio truncato-lobato, dorso subtiliter dense punctato, lateribus marginato; scutello sat magno, obtuse triangulari, punctulato; elytris punctato-substriatis, punctis sat grossis, intervallis rugulosis, alternatim subcostatis, apice laeviore.* — Cochinchine.

Le genre *Eubrianax* a été créé, dans la famille des Dascillides, par Kiesenwetter pour un insecte du Japon. En voici les caractères (Berl. Ent. Zeit., 1874, 246) :

*Antennæ ♂ pectinata, ♀ serratæ. Pupi maxillares graciliores, articulo ultimo apice truncato, labiales articulo ultimo triangulari, apice latius truncato. Prothorax antice rotundato-productus, caput omnino obtegens. Tarsi simplices, unguiculis tobo membranaceo linearis usque ad basin libero auctis.*

Ce genre remarquable forme, dit Kiesenwetter, le passage entre les Dascillides et les Lampyrides ; il présente la conformation des segments ventraux qu'on remarque chez les *Eubria*, dont son faciès le rapproche assez bien.

Notre espèce diffère du *ramicornis* Ksw. par la taille bien plus faible, la coloration moins noire, le corselet d'un testacé fauve, avec une tache brune au bord antérieur, le bord postérieur tronqué vis-à-vis de l'écusson, les élytres avec les intervalles alternativement un peu relevés, et les pattes entièrement d'un fauve testacé.

*SCIRTES COSTULIPENNIS*. — Long. 5 1/2 mill. — *Ovato-ellipticus, convexus, picco-fuscus, nitidus, dense subtiliter griseo-pubescent;* capite

sat lato, dense subtiliter punctato, summo medio brevissime sulcatulo; antennis fuscis, basi piceis, articulis 2° 3°que subaequalibus et ceteris brevioribus; prothorace longitudine triplo latiore, antice valde angustato, margine postico late sat fortiter bisinuato, angulis posticis rectis, dorso densissime ruguloso-punctato; scutello similiter punctato, triangulari, convexiusculo; elytris oblongis, lateribus fere rectis, apice conjunctim rotundatis, dense minus subtiliter punctato-rugulosis, utrinque quadricostulatis, costula externa obsoleta, ceteris basi et apice oblitteratis, 1<sup>a</sup> postice breviore, sutura basi sat elevata, postice multo minus; subtus rufo-piceescens, femoribus posticis latissimis, compressis, tibiis unco elongato leviter arcuato, altero minutissimo armatis. — Tonkin.

La forme de cet insecte est plus oblongue et moins ovalaire que celle des autres *Scirtes*, les fémurs postérieurs sont plus comprimés; la sculpture des élytres, qui présentent chacune trois côtes bien nettes quoique médiocrement saillantes (la quatrième est à peu près effacée), le rendent facile à reconnaître.

**PLATEROS SYCOPHANTA.** — Long. 6 1/4 mill. — Oblongus, postice vix sensim ampliatus, fuscus, parum nitidus, prothorace lateribus late ferrugineo; capite verticali, inter oculos transversim sat late impresso; antennis dimidium corporis fere attingentibus, latis, compressis, apice paulo angustioribus; prothorace transverso, basi elytris haud angustiore, antice leviter attenuatis, lateribus post medium convergentibus, margine antico obtuse rotundato, medio incrassato, dorso utrinque late depresso, disco paulo convexo, subtiliter transversim striolato, medio sat late leviter transversim depresso, margine postico medio truncato, utrinque levissime sinuato, angulis posticis subacutis; scutello oblongo-ovato, apice obtuso, subtiliter strigosulo; elytris elongatis, basi breviter attenuatis, apice fere obtusis tenuiter, costulatis alternatim paulo magis elevatis, intervallis dense crenato-punctatis. — Hanoï (Aubert).

Cette espèce se rapproche beaucoup du *P. lictor* Newm., de l'Amérique du Nord; elle en diffère par le corselet un peu moins court, ne se rétrécissant guère en avant qu'après la moitié, à angles postérieurs bien moins saillants, courts et à peine arqués en arrière, à bordure latérale plus large, interrompue en avant et à la base, à bord postérieur très faiblement sinué de chaque côté, et par les élytres plus arrondies à l'extrémité, avec les côtes un peu plus marquées. — Hanoï.

**RHAGOPHTHALMUS TONKINEUS.** — Long. 6 1/2 mill. — Oblongus, sat convexus, brunneo-piceus, nitidus, breviter sat dense fulvo-pilosus.

subtus cum pedibus fulvus; capite punctulato, medio paulo concavo, antennis fulvis, serratis, pilosis, articulo ultimo gracili acuto, articulis 2 primis fere aequalibus, crassis, 3<sup>o</sup> graciliore, sequenti vix longiore; prothorace transverso, elytris vix angustiore, margine antico late arcuato, posteriore medio sat late sinnato et anguste marginato, ante angulos utrinque similiter sinuato, his paulo obtuse productis, dorso punctulato, paulo inaequali basi utrinque impresso; scutello fulvido, apice truncato; elytris postice angustatis, apice separatim obtuse rotundatis, utrinque tricostulatis, costula 1<sup>a</sup> cum 2<sup>a</sup> post medium coenante. 2<sup>a</sup> longiore, magis elevata, 3<sup>a</sup> postice tantum distinguenda, lateribus fusco ciliatis. — Tonkin (de Beauchène).

Diffère du *scutellatus* Motsch. par sa taille bien plus faible, sa coloration plus roussâtre, ses yeux plus largement séparés, le corselet un peu plus large, à angles postérieurs moins saillants, l'écusson tronqué et les élytres plus arrondies à l'extrémité. Diffère également du *sumatrensis* E. Ol. par sa taille bien plus faible, ce dernier a de 10 à 11 mill. de longueur, l'incision des yeux elliptique, le corselet testacé, rembruni au milieu, avec une étroite bordure latérale noire, l'écusson triangulaire, l'abdomen rembruni à l'extrémité, et les antennes pectinées: avec le deuxième article court et le troisième grêle.

**CARPHURUS VARIVENTRIS.** — Long. 6 mill. — Elongatus, rufus, nitidus, elytris fusco-cyanescentibus, fusco-pilosus, segmentis abdominalibus medio fusco-maculatis, his maculis interdum obsoletis; capite inter oculos profunde biimpresso; antennis rufis, apice infuscatis, sat elongatis, modice serratis, articulo 4<sup>o</sup> duobus segmentibus conjunctis aequali, 2<sup>o</sup> tertio parum breviore; prothorace elytris parum angustiore, longitudine haud aut vix latiore, antice convexo et rotundato, lateribus fere rectis, angulis posticis rotundatis, dorso laevi, basi fortiter transverso et antice utrinque modice impresso; elytris abdominalis longitudini aequalibus, apicem versus paulo ampliatis, subtiliter densissime ruguloso-punctatis; abdomine laevi, segmentis basi transversim depresso, margine apicali convexo, longius hirsutis; pedibus obscure rufescensibus, anticis dilutioribus. — Tonkin.

Ressemble beaucoup au *C. telephoroides* Fairm., de Gayndah, mais moins convexe, avec les antennes moins longues, moins robustes, et l'abdomen moins conique, moins acuminé, les côtés des segments étant légèrement arrondis.

**TILICERA MULTIPARTITA.** — Long. 5 à 6 mill. — Modice elongata, con-

vexa, nigro-fusca, nitida, fulvo-griseo-pilosa, elytris nigris, basi rufis, vitta media transversa et vitta ante apicali flavidis, vitta nigra anteriore antice flavidio marginata; capite fere laevi; antennis articulis 6-10 serratis, basi et articulo ultimo flavidis, hoc majore ovato-subquadrato; prothorace interdum rufo, macula antica fusca, basi sat abrupte constricto, subtiliter punctulato; elytris basi grosse seriato-punctatis, punctis ad vittam medianam interruptis, postice subtilissime punctulatis; subtus rufa, abdomine fusco, pedibus rufis, femoribus fuscis. — Tonkin (de Beauchêne).

La coloration de cette espèce est un peu variable; le corselet est parfois d'un brun noir, tantôt plus ou moins rougeâtre avec la partie antérieure d'un brun noir; les antennes sont parfois entièrement noires avec la base rousse; les fémurs sont parfois roux avec l'extrémité noire.

Resssemble au *T. javanica*, mais un peu plus petit, avec le corselet non rétréci en avant et les élytres avec deux bandes transversales jaunes, dont une presque apicale, au lieu de deux taches sur le milieu du disque et d'une large bande après le milieu.

**ENOPLIUM BALTEATUM.** — Long. 4 1/2 mill. — Elongatum, convexum, fuscum, sat nitidum, fulvo-hirtum, capite, prothorace femorumque basi rufis, elytris post medium vitta sat lata transversali fulva; capite convexo, subtiliter sat dense punctulato, mandibulis apice nigris, palporum articulo ultimo subovato, oblique truncato, oculis valde convexis; antennis fuscis, basi rufis, clava magna opaca, funiculo octo-articulato; prothorace elytris parum angustiore, subquadrato, latitudine vix longiore, angulis posticis rotundatis, anticis valde obtusis, dorso dense punctato, basi et lateribus marginato; scutello rufo, truncato; elytris parallelis, ad humeros angulatim rotundatis, apice obtuse rotundatis, fortiter seriato-punctatis, post vittam transversalem irregulariter ruguloso-punctatis; subtus cum pedibus longe griseo pilosum. — Tonkin (de Beauchêne).

Cet *Enoplium* ressemble assez à un *Tarsostenus univittatus*, mais la coloration de la tête et du thorax, la massue antennaire et la bordure du corselet sont fort différentes.

Les antennes ont bien onze articles; le dernier article de tous les palpes est peu sécuriforme.

**OPETIOPALPUS AFFINIS.** — Long. 2 mill. — Ovato-oblongus, convexus.

capite, prothorace, scutello pedibusque rufis, capite obscuriore, parum nitidis, subopacis, pilosis, elytris fuscis, nitidulis, pilis fuscis et albidis hirsutis, his ad latera et suturam densioribus et fere vittatim dispositis, antennis rufis, clava fusca; capite, scutello prothorace que sat subtiliter densissime punctatis; prothorace elytris paulo angustiore, transverso, antice et postice fere aequaliter angustato; scutello fere rotundato; elytris ad humeros angulatis, apice conjunctim rotundatis, dorso sat grosse sat dense punctatis, punctis suturam versus paulo seriatis, intervallis fere rugulosis, alutaceis, sutura elevata. — Tonkin (de Beauchêne).

Parait voisin de l'*O. obesus* White, des Indes orientales (1); mais ce dernier serait plus grand, plus court et à pilosité noire. Dans notre espèce, la tête est plus foncée que le corselet, presque brune, la villosité brune est mêlée de poils blanchâtres, notamment sur les élytres, où ils forment une bande peu tranchée sur la suture et sur les côtés.

**HOPLOCEPHALA NIGROÆNEA** Motsch. — Long. 4 mill. — Ovato-elliptica, fusco-virens, nitida, antennis pedibusque ferrugineis; capite parvo, medio cavato et utrinque dente acute conico horizontali armato; antennis basin prothoracis attingentibus, parum latis, articulis paulo transversis. 2° 3° que basalibus sat angustis, 4-7 subangulatis; prothorace transverso, basi elytris vix sensim angustiore, antice angustato, margine postico utrinque sat fortiter sinuato, medio fere lobato, angulis posticis rectis, dorso subtiliter dense punctulato, angulis anticis sat deflexis, obtusis; scutello triangulari punctulato; elytris ovatis, striatis, striis leviter punctatis, intervallis planiusculis, subtilissime punctulatis. — Tonkin (Aubert).

Je ne puis séparer cet insecte de l'*H. nigroænea* du Japon; il ne me paraît en différer que par la forme un peu plus atténuee des élytres.

**HOPATRUM OCTOCOSTATUM.** — Long. 6 mill. — Subovatum, convexum, nigrum, nitidum, indumento terreno vestitum, et ferrugineo-setulosum; capite asperulo, summo medio sat fortiter convexo, antice leviter impresso; antennis brevibus, medium prothoracis haud superantibus, articulis penultiinis transversis; prothorace longitudine duplo latiore, medio elytris paulo latiore, basi abrupte angustato, lateribus rotundatis, basi sinuatis, margine postico utrinque leviter sinuato, angulis fere

(1) *O. OBESUS* White, Clerid., 63. — Long. 1 1/2 l. — Small, thick and convex, somewhat shining, punctured, with black bristles. Head and prothorax of a dull sanguineous. Elytra black without spots. Antennæ and legs of a reddish chestnut; club of antennæ dull colour.

rectis, dorso asperato, opaco, medio convexo et longitudinaliter leviter impresso, postice utrinque oblonge impresso, lateribus sat late depresso; scutello triangulari, nitido; elytris punctato-substriatis, intervallis obsolete plicatulis, utrinque costis 4 sat acutis, tenuibus, subtiliter crenulatis et setulosis, intervallis externis paulo asperatis, sutura paulo elevata. — Tonkin (de Beauchêne).

Cette espèce est bien remarquable par son corselet dont les côtés sont dilatés et brusquement rétrécis à la base et dont les élytres présentent chacune quatre côtes bien saillantes, ce qui rappelle un peu les *Scleron*.

**OPATRINUS ANNAMITA.** — Long. 40 à 43 mill. — Oblongus, sat convexus, niger, subnitidus, capite prothoraceque densissime subtiliter punctatis, hoc antice arcuatim angustato, margine postico utrinque sat fortiter sinuato, angulis acutis; elytris fortiter striatis, striis fundo subtiliter punctatis, intervallis convexiusculis, subtiliter dense punctulatis. — Cochinchine (Dorr).

Cet *Opatinus* ressemble beaucoup à l'*O. semicribrosus* de Guinée; il n'en diffère que par le corps un peu plus large, surtout le corselet, les intervalles des stries des élytres plus finement, à peine visiblement ponctués, la tête finement striolée en dessous et non ponctuée, et le métasternum sillonné au milieu; les derniers articles des antennes sont aussi plus larges, plus angulés en dedans et le dernier est bien plus tronqué.

**DEROSPILERUS SUBCOSTULATUS.** — Long. 40 mill. — *D. alutaceo* Fairm. simillimus, niger, nitidus, sed prothorace transverso, breviore, lateribus magis rotundato, elytris brevioribus profundius striatis, striis crenulatis, intervallis sat fortiter convexis, fere laevibus, abdomine magis punctato et mesosterno medio magis sulcato distinguendus. — Cochinchine (Dorr).

Le *D. gibbicollis* Fleut., du même pays, est un peu plus grand, d'un noir mat, avec la tête finement chagrinée et le corselet fortement et densément ponctué, tandis que, chez le *costulatus*, la tête et le corselet sont assez finement quoique assez densément ponctués. Le *D. simillimus* Fairm., de Manille, qui lui ressemble également beaucoup, est sensiblement plus grand, les élytres sont un peu plus amples, avec les intervalles un peu moins convexes et bien plus densément ponctués; la coloration est un peu moins brillante.

**CATAPIESTUS CRENLICOLLIS.** — Long. 11 mill. — Oblongus, planatus, totus fuscus, nitidus; capite dense punctato, post oculos sat acute angulato; antennis articulis 3-10 transversis, serratis; prothorace transversis elytris paulo angustiore, lateribus rotundatis, obtusissime denticulatis, angulis omnibus valde acutis, dorso medio fere levè et longitudinaliter canaliculato, lateribus subtiliter punctato, obsolete longitudinaliter impresso et bifoveolato scutello breviore, haud impresso; elytris punctato-striatis, striis crenatis, punctis grossis, lateribus acute carinatis; subtus nitidior, dense punctatus, prosterno lateribus ruguloso, medio antice fere levè et postice late impresso, pedibus punctatis femoribus anticis subtus dente minuto sat acuto armatis. — Cambodge.

Cette espèce se distingue facilement du *C. piceus* Perty, de Java, par son corselet dont la partie médiane est presque lisse, à peine ponctuée, avec un sillon étroit atteignant la base, au lieu d'une large impression oblongue, et dont les côtés offrent deux fossettes au lieu d'une impression oblongue; le milieu du bord antérieur est plus obtusément angulé, les bords latéraux sont moins denticulés; la tête est ponctuée au lieu d'être rugueuse; l'écusson est un peu plus court; les antennes ont aussi les articles 3 à 10 moins saillants en dedans.

La crénulation plus ou moins forte des côtés du corselet distingue facilement ces deux espèces du *C. mediocris* Guér., de Bornéo. — Long. 11 mill. — Allongé, aplati, d'un brun noirâtre. Tête et corselet ponctués. Corselet transversal, rétréci et sinueux en arrière, rebordé, sans crénellures sur les bords. Élytres plus larges que le corselet, avec des stries fortement ponctuées et comme crénelées. Cuisses antérieures renflées, armées au milieu, du côté interne, d'une forte dent conique, et en offrant deux plus faibles vers l'extrémité. Abdomen finement ponctué et ridé. Pattes noires, à cuisses ponctuées.

On peut ajouter que cet insecte est plus petit que le *piceus*, avec les impressions latérales du corselet beaucoup moins marquées et que les fémurs antérieurs sont plus épais, avec les tibias plus arqués.

**NYCTOBATES INEQUALIS.** — Long. 15 mill. — Oblongus, convexus, nigro-subcærulescens, valde nitidus; capite subtiliter sat dense punctato, summo tenuius, inter oculos obsolete impressiusculo, sutura elypeali sat fortiter impressa; antennis basin prothoracis attingentibus, articulo 6-10 latioribus, triangularibus, opacis, dense punctatis, articulo 3<sup>e</sup> quarto paulo longiore; prothorace elytris angustiore, transverso, lateribus et ad angulos anticos rotundatis, basi sat fortiter marginata,

utrinque vix sinuata, angulis posticis acute rectis, dorso paulo inaequali et sat inaequaliter punctato, medio longitudinaliter et antice utrinque leviter sulcatulo aut potius impressiusculo; scutello lateribus rugosulo; elytris subparallelis, apice obtusis, basi ad humeros paulo obliquatis, dorso seriatim foveolatis, seriebus 3 primis tantum grosse punctatis, apice foveolatis, intervallis disco et postice transversim plicatulis suturam versus fere laevibus; subtus alutaceus, abdomine alutaceo-punctulato, prosterno inter coxas sat lato, sat abrupte elevato, postea breviter bisulcato, apice fere truncato, mesosterno modice et arcuatim concavo, lateribus haud acute elevatis, femoribus sat clavatis, tibiis vix arcuatis, tarsis posterioribus articulo 4<sup>o</sup> ceteris conjunctis aequali. — Tonkin (de Beauchêne).

Très voisin du *N. Barberetii* Fairm., de Tchousan, mais beaucoup plus petit, à tête ponctuée, à antennes n'ayant que les cinq derniers articles plus larges, la sculpture du corselet et celle des élytres sont presque identiques, mais les fossettes de ces dernières sont moins fortes.

**ENCYALESTHUS FOVEOSERIATUS.** — Long. 15 mill. — Oblongus, convexus, aeneus, nitidus; capite vix perspicue punctulato, inter oculos obsoletissime impresso; antennis brevibus, fusco-metallicis, articulis penultimis transversis; prothorace elytris angustiore, transverso, antice et postice aequaliter angustato, lateribus leviter arcuatis, basi marginata, utrinque sinuata, angulis posticis paulo exsertis, dorso inaequali et inaequaliter punctato, antice utrinque impresso; scutello paulo concavo; elytris subparallelis, ad humeros obliquatis, postice et abrupte angustatis, apice obtusis, dorso punctis sat grossis seriatim impressis, serie suturali minus grosse punctata, substriata; subtus cyanescenti-fuscus, laevis, abdomine subtilissime striolato, femoribus clavatis. — Cambodge (coll. du Muséum).

Forme du *brevicornis*, mais plus robuste et bien distinct par les gros points qui forment des séries et non des stries sur les élytres.

#### ETAZETA, nov. gen.

Corpus oblongo-ovatum, postice paulo ampliatum; caput breve, truncatum, oculi reniformes, sat grosse granulati; mentum medio dentiforme, palpi maxillares articulo ultimo fere triangulari, truncato, mandibulae crassæ. Antennæ crassæ, breves, sub auriculis lateralibus insertæ, apicem versus leviter crassiores, dense punctatae. articulo 3<sup>o</sup> sequentibus paulo longiore, ultimo praecedenti haud longiore, obtuso.

Prothorace elytris fere dimidio angustior, lateribus et basi subtiliter marginatus. Elytra sat ampla, striolata, margine epipleurali basi lato, ante medium angustato. Prosternum apice sat acutum, mesosternum furcato-emarginatum, processus inter coxalis sat rotundatis. Pedes mediocre, tarsi subitus dense spongioso-tomentosi, articulo penultimo, lato, integro.

Le facès de cet insecte fait penser aux *Lagria*, avec lesquelles il n'a qu'une ressemblance apparente ; sa place naturelle me paraît être près du genre *Ediatorix*, de Java, dont il diffère par le corselet transversal, les antennes courtes et épaisses, les yeux plus gros et les élytres sans côtes saillantes.

E. AENEICOLOR. — Long. 11 à 12 mill. — Ovato-oblonga, postice paulo ampliato, sat convexa, nitida, fusco-metallica, elytris æneo-metallicis ; capite parum dense sat fortiter punctato, antice paulo incrassato et transversim leviter impresso ; prothorace capite paulo latiore, elytris fere dimidio angustiore, paulo transverso, lateribus, antice præsertim sat rotundato, angulis anticis rotundatis, margine postico recto, angulis obtuse rectis, dorso subtiliter laxe punctulato, basi anguste marginato ; scutello fere semirotundo, laxe subtiliter punctato ; elytris ad humeros rotundatis, postice ampliatis, apice obtuse conjunctim rotundatis, pluricostulatis, costulis suturam versus minus elevatis, intervallis sat subtiliter irregulariter punctulatis ; subtus laevis, meso- et metapleuris punctatis, abdomine lateribus obsolete punctulato. — Hué (Fleutiaux) : Tonkin (de Beauchêne).

4. EUCYRTUS CORINTHIUS. — Long. 8 mill. — Ovato-oblongus, sat fortiter convexus, fusco-aeneus, nitidus, elytris fusco-aeneis, leviter violaceis, sutura paulo virescente, margine laterali anguste cærulescenti ; capite subtiliter dense punctato, sutura clypeali profunde, ad latera latius impresso ; antennis brevibus, basin prothoracis haud attingentibus, fuscis, articulis 7 ultimis latioribus, opacis, 6-10 transversis, clavam elongatam efficientibus ; prothorace elytris angustiore, valde transverso, lateribus antice cum angulis rotundatis, angulis posticis valde acutis, dorso subtiliter sat dense punctato, basi minus punctato et utrinque transversim leviter impresso ; scutello triangulari, sat acuto, vix punctulato ; elytris post medium leviter ampliatis, apice conjunctum obtusis, leviter punctato-striatis, striis apice suturam versus profundioribus et subinterruptis, intervallis planiusculis, subtilissime punctulatis ; subtus

cum pedibus fusco-cærulescens, nitidus, laevis, abdomine basi leviter punctulato. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble à l'*E. punctato-lineatus* Fairm., de Sumatra ; en diffère par la taille bien moindre, les antennes à longue massue, les angles antérieurs du corselet arrondis, les élytres à stries marquées, mais plus finement ponctuées ; la coloration est bien plus sombre.

2. EUCYRTUS INFIMUS. — Long. 5 mill. — Oblongo-ovatus, convexus, postice vix sensim ampliatus, fusco-cærulescens, valde nitidus, elytris purpureis, ad suturam leviter ænescentibus, vitta discoidali oblonga cœrulea ; capite prothoraceque dense subtiliter punctulatis ; antennis basin prothoracis paulo superantibus, basi testaceo-piceis, articulis 6 ultimis fuscis latioribus ; prothorace trapeziformi, basi elytris vix angustiore, longitudine duplo latiore, antice angustato lateribus ante angulos antice paulo rotundatis, basi ad scutellum recta, utrinque late sinuata, haud marginata, dorso subtiliter dense punctulata, ad scutellum obsolete impresso ; scutello punctulato, sat acute ogivali ; elytris punctulato-striatis, striis apice et extus obsolescentibus, intervallis planis, subtiliter sat dense punctulatis ; subtus piceo-ænescens, coxis, femoribus, basi tarsisque piceo-rufescentibus. — Hué, communiqué par M. Fleutiaux.

Cette espèce, la plus petite du genre, se distingue en outre par sa forme ovalaire, rappelant un peu celle de quelques *Platydema*. Elle diffère du *corinthius*, en outre de la taille bien plus faible, par le corps plus elliptique, le corselet trapézoïdal, rétréci en avant, élargi à la base, qui n'est pas plus étroite que celle des élytres.

#### PSEUDEUMOLPUS Kraatz.

M. Kraatz a créé sous ce nom (Deuts. Entom. Zeits., 1880, 444) un genre de Cnoidalide qu'il caractérise ainsi qu'il suit :

Antennæ apicem versus sensim dilatatae, vix clavatae medianam thoracis partem vix superantes. Palpi maxillares articulo ultimo securiformi, labiales ovato. Capitis structura fere eadem quæ in genere praecedenti (*Pseudabax*), clypeus magis productus quam in genere *Eucyrto*; epistomum vix emarginatum. Thorax coleopteris paulo angustior, lateribus leviter rotundatis, deflexiusculis, angulis anticis leviter productis, posticis subrectis, retrorsum vix prominulis, supra leviter rotundatis, marginibus lateralibus minus late reflexis, basali distincto. Elytra convexiuscula, pone medium leviter dilatata, subtus æqualiter punctato-striata.

striis haud elevatis. Pedes mediores, femoribus antice dilatatis, dente valido armatis, tibiis anticis leviter incurvatis, tarsis posticis articulo 1° secundo duplo fere longiore, tertio interdum dimidio interdum multo minore, minutissimo. Genus colore et habitu Eumolpinis sub-simile.

Je rapporte à ce genre une espèce du Tonkin qui présente aussi une forte dent aiguë aux fémurs antérieurs, mais chez lequel les élytres présentent de gros points formant de faibles stries. Le faciès rappelle en effet assez bien celui des Eumolpides et la dent fémorale ajoute à cette ressemblance.

*P. SERIATOPORUS*. — Long. 7 1/2 mill. — Oblongo-ovatus, valde convexus, cupreo-purpurascens, nitidus, capite summo et prothorace antice basique viridi vage tinctis, elytris sutura et lineis flexuosis viridibus; capite sat dense, antice densius punctato, utrinque antice oblique impresso, labro truncato, dense punctato; antennis fuscis, nitidis, medium prothoracis vix attingentibus, articulis 5° ultimis gradatim latioribus, punctatis, 9° 10° que transversis, 41° longiore, apice rotundato; prothorace transverso, lateribus fere rectis, antice rotundatis, basi obliquatis, angulis posticis obtusis, anticis rotundatis, dorso undique marginato, sat dense punctato, paulo inaequali; scutello minuto, triangulari, laevi; elytris ovatis, medio paulo ampliatis, postice valde declivibus, apice obtusis, dorso substriato-punctatis, punctis grossis, apicem versus haud oblitteratis, intervallis convexisculis, subtilissime punctatis, externis magis convexis; subtus cum pedibus fusca, vage ænescens, nitidus, prosterno valde canaliculato, abdomine punctulato, lateribus subtiliter striolato, femoribus anticis subtus dente valido acuto armatis, tibiis leviter curvatis. — Tonkin.

La grosse ponctuation des élytres et la petite taille distinguent cette espèce de ses congénères.

*HETEROTARSUS PUSTULIFER*. — Long. 10 mill. — Oblongus, modice convexus, niger, supra subopacus, subtus cum pedibus nitidus, elytris nitido-tuberosis; capite dense punctato-ruguloso, inter oculos sat fortiter impresso; antennis gracilibus, fuscis, fuliginoso-pubescentibus, articulis 4° ultimis paulo latioribus, opacis, articulo 3° duobus sequentibus aequali; prothorace elytris angustiore, transverso, basi et antice aequaliter angustato, lateribus medio obtusissime angulatis, angulis omnibus acutis, margine postico ante angulos sinuato, dorso sat subtiliter densis-

sime punctulato-rugosulo; scutello obtuso, dense punctulato, nitidulo; elytris ovatalis, post medium leviter ampliatis, apice conjunctim obtuse rotundatis, striatis, striis subtilissime punctatis, postice haud obsolescentibus, intervallis alutaceis, interrupto-costatis, aut tuberculis oblongis aut ovatis, nitidis, interdum sat elongatis obsitis, sutura et costula praescutellari nitidis; prosterno rugoso, subopaco, metasterno medio subtiliter strigosulo, metapleuris et abdomen dense punctatis, pedibus punctatis. — Tonkin (de Beauchêne).

La sculpture des élytres est très remarquable et rappelle celle du *Bolitophagus interruptus*; pour le corselet, cet insecte se rapproche beaucoup de l'*H. carinula*, de la Chine et du Japon, dont les élytres ont des côtes non interrompues.

**HELOPS (LAMPEROS) ASPERIPENNIS.** — Long. 44 mill. — Oblongus, subparallelus, modice convexus, aeneus, nitidus, capite prothoraceque paulo minus nitidis; capite subtiliter densissime punctato, antice truncato et utrinque leviter impresso; antennis basin prothoracis paulo superantibus, aenescenti-piceis, articulo 3<sup>o</sup> modice elongato, duabus ultimis precedentibus haud brevioribus; prothorace transverso, elytris angustiore, antice et postice aequaliter angustato, lateribus medio obtusissime angulatis, angulis omnibus fere similiter rectis, dorso dense punctato, fere strigosulo, postice utrinque oblique impresso; scutello sat lato, apice obtuse angulato, subtilissime punctulato; elytris oblongo-elongatis, fere parallelis, post medium vix sensim ampliatis, postea angustatis, apice obtusis, dorso striatis, striis levibus, intervallis convexiusculis, sat subtiliter sat dense punctatis, laxe tuberculatis; subtus infuscatus, sat subtiliter dense punctato-asperulus. — Tonkin (de Beauchêne).

La sculpture des élytres rappelle celle de l'*Helops congener* et distingue cette espèce de l'*H. brunneus* Mars., du Japon.

**AMARYGMUS CUPREO-FOSSUS.** — Long. 9 mill. — Ovatus, convexus, aeneus, valde nitidus, capite prothoraceque paulo cærulescentibus, elytris punctis cupreis seriatis; capite subtilissime dense punctulato, oculis approximatis, antennis gracilibus, fusco-piceis, basi cum palpis piceis, articulo 3<sup>o</sup> duobus segmentibus conjunctis fere aequali; prothorace transverso, elytris angustiore, antice valde angustato, margine postico medio obtusissime lobato et utrinque leviter sinuato, dorso dense sat subtiliter punctato; elytris ovatis, medio convexis, punctis sat grossis cupreis seriatim impressis, intervallis sat subtiliter dense punctatis;

subtus fuscus, nitidus, pectore subtiliter asperulo, abdomen sat dense sat subtiliter punctato-asperulo, coxis rufo-piceis, prosterno inter coxas ntrinque elevato, metasterno rugosulo. — Tonkin (de Beauchêne).

Cette espèce est, je crois, la première du genre qui soit signalée dans l'Indo-Chine ; elle se distingue par la sculpture des élytres qui offrent des séries de gros points enfoncés, cuivreux, ce qui la rapproche de l'A. *Hasseltii* Fairm., de Sumatra ; mais, chez ce dernier, les points des élytres sont moins gros et un peu violacés, tandis qu'ici ils sont gros, violacés au fond, mais entourés d'un anneau cuivreux, leurs intervalles sont assez densément ponctués et les externes ne sont pas relevés à l'extrémité ; les antennes sont plus grèles, insensiblement épaisse vers l'extrémité et le quatrième segment ventral n'est pas profondément sillonné en travers ; enfin le prosternum n'est nullement sillonné entre les hanches et les bords sont un peu relevés.

**PLESIOPHTHALMUS ARMICRUS.** — Long. 16 mill. — Oblongo-ovatus, valde convexus, aeneo-metallicus, nitidus, antennis tarsisque aeneo-fuscis ; capite dense punctato, antice fulvo-piloso, oculis approximatis, supra obtuse angulatis, labro fusco, piloso ; antennis gracilibus, medium corporis haud attingentibus, articulis apicem versus paulo brevioribus, vix crassioribus ; prothorace elytris angustiore, transverso, antice angustato, antice et lateribus evidenter, basi obsolete marginato, dorso dense punctato, basi medio obsolete impressiusculo ; scutello breviter ogivali, subtiliter punctato ; elytris oblongo-ovatis, apice obtuse acuminate, ad humeros rotundatis, medio elevatis, dorso fortiter striato-punctatis, punctis basi grossis, postice minoribus, intervallis paulo convexis, obsolete punctatis ; subtus aeneo-subauratus, subtiliter punctatus, prosterno inter coxas sat angusto, arcuato, sulcato et infra sat acuto, mesosterno valde excavato, triangulariter exciso, processu intercoxal triangulare, parum acento, pedibus punctatis, femoribus anticeis subtus dilatatis et dente acento armatis, tarsis subtus pilosis. — Tonkin (de Beauchêne).

Diffère de ses congénères par sa forme plus courte, plus convexe, et surtout par ses fémurs antérieurs plus larges, armés d'une épine aiguë. C'est du *P. sericeifrons* que cette espèce se rapprocherait le plus. Elle est la première signalée en dehors de la Chine, du Japon et de la Corée.

4. **STRONGYLIUM MOROSUM.** — Long. 9 mill. — Elongatum, subparalle-

lum, valde convexum, fuscum, parum nitidum, capite prothoraceque minus nitidis; capite dense punctato, oculis magnis, antice valde approximatis, clypeo ante oculos profunde transversim sulcato; antennis fractis; prothorace transverso, elytris angustiore, capite vix latiore, dense punctato, lateribus rotundato, basi transversimi breviter depresso; scutello ogivali, punctulato; elytris ad humeros rotundatim angulatis, apice obtusis, dorso late sulcatis, sulcis fortiter crenatis, intervallis carinatis, levibus; subtus caerulescens, lateribus punctato; pedibus sat gracilibus, punctatis. — Cochinchine.

2. *STRONGYLUM SERRICORNE*. — Long. 43 mill. — Elongatum, subparallelum, valde convexum, nigro-fuscum, nitidum, capite prothoraceque subopacis; capite dense sat subtiliter punctato, inter oculos levigato, his antice fere contiguis, clypeo ante oculos sat subtiliter transversim carinulato; antennis medium corporis paulo superantibus, fuscis opacis, articulis 3 primis gracilibus, nitidus, ceteris oblongo-triangularibus, apice intus angulatis, ultimo oblongo, precedenti paulo angustiore, 2 primis brevibus, 3° sequenti aequali; prothorace elytris valde angustiore, transversim subquadrato, lateribus vix arcuatis, ante angulos posticos vix sinuatis, his acutinsculis, dorso densissime punctato, fere ruguloso, linea longitudinali media vix distincta; scutello triangulari, vix distincte punctulato; elytris ad humeros sat angulatis, apice obtusis, dorso punctato-striatis, intervallis sat convexis, subtilissime vix perspicue punctulatis, suturam versus paulo latioribus; subtus cum pedibus fere nitidius, pectore medio fere levii, lateribus sat fortiter punctato, abdomen subtiliter punctulato, pedibus gracilibus punctatis. — Cochinchine.

Resssemble assez au précédent; mais plus grand, avec les yeux plus rapprochés en avant, presque contigus, et les élytres à stries plus étroites, avec les intervalles bien plus larges et bien moins convexes.

*MACRATRIA PALLIPES* Motsch. — Long. 6 mill. — Elongata, subcylindrica, fusco-brunnea, parum nitida, fulvo-pubescent, antennis, palpis pedibusque testaceo-fulvis, tibiis paulo obscurioribus; capite subrotundo, fere levii, summo medio sulcatulo; antennis basin prothoracis vix attingentibus, articulis 3 ultimis longioribus; prothorace ovato, convexo, capite latiore, lateribus ante basin leviter sinuato, basi leviter marginata, angulis posticis obtusis, dorso sat subtiliter dense asperulo; scutello minuto, apice obtuso; elytris prothoracis basi fere duplo latio-

ribus, elongatis, apice rotundatis, ad humeros sat rotundatis, dense sat subtiliter ruguloso-punctatis, obsolete elevato-lineatis, lineis apice obliteratis ; pedibus sat validis. — Tonkin (de Beauchêne).

Sauf la taille, je ne puis trouver de différences entre les individus provenant du Tonkin et l'espèce de Ceylan décrite par Motschulsky.

**CASNOMIDEA TERMINATA.** — Long. 8 mill. — Oblonga, sat convexa, rufo-testacea, nitida, capite, elytrorum macula apicali pedibus æneo-nigris, femoribus (apice excepto) rufo-testaceis, antennis fuscis opacis ; capite inter oculos punctato, antice transversim impresso, cum oculis prothorace haud sensim latiore, basi valde constricto ; antennis sat validis, medium corporis haud attingentibus, articulis intermediis subserratis, ultimis elongatis, ultimo longiore, præcedenti vix dimidio longiore ; prothorace elytris dimidio angustiore, latitudine haud latiore, angulis anticis valde rotundato, lateribus ante basin breviter sinuato, dorso fortiter parum dense punctato, basi fortiter marginato ; scutello lævi, apice obtuso ; elytris oblongis, post medium leviter ampliatis, apico obtusis, ad humeros sat angulatis, dorso fortiter crenato-striatis, striis apice decrescentibus, intervallis convexiusculis, basi magis elevatis, punctis distantibus impressis ; pedibus sat gracilibus, fulvo-pilosis. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble assez à la *C. nucea* Fairm., de Sumatra, mais un peu plus grande, avec une tache apicale aux élytres, le dernier article des antennes beaucoup plus court, le corselet à ponctuation forte, peu serrée, mais répandue sur toute la surface.

Ressemble surtout à *l'atriceps* Fairm. ; mais plus grande, avec la tête glabre, la bouche noire, le dernier article des antennes bien plus court, les élytres sensiblement élargies après le milieu et les pattes presque entièrement brunes.

C'est la première espèce de ce genre que l'on trouve sur le continent ; toutes les autres sont propres aux îles de la Sonde, à Sumatra notamment.

On trouve à Célèbes l'espèce suivante :

**CASNOMIDEA ATRICAPILLA.** — Long. 9 mill. — Magis convexa, flavo-fulva, nitida, capite nigro, femoribus apice late fuscis, abdomine apice fusco ; capite vix punctato, antennis basi fulvis, apice infuscatis, gracilibus, articulo ultimo 4 præcedentibus conjunctis æquali ; prothorace ad

angulos anticos minus rotundato, dorso minus fortiter punctato ; clytris elongatis, subparallelis, crenato-striatis, striis apice levibus, intervallis convexiusculis, levibus ; subtus lateribus punctata. — Kandavi (Bec-  
cari).

Diffère de *Patriceps* par les élytres unicolores, le corselet moins ar-  
rondi aux angles antérieurs, la tête glabre, les antennes fauves à la base  
et les pattes fauves, sauf l'extrémité des fémurs.

**ZONITIS DOLLEI.** — Long. 40 mill. — Oblonga, postice paulo ampliata,  
convexa, rufo-testacea, nitida, elytris antennisque (basi excepta) fuscis,  
tarsis apice paulo obscurioribus, prothorace medio paulo infuscato ;  
capite elongato, parce punctato, inter oculos paulo rugosulo, fronte  
foveola minuta signata, mandibulis apice fuscis ; antennis validiusculis,  
elytrorum medium paulo superantibus, apicem versus paulo latioribus  
articulo 2° minuto, 3° 4°que æqualibus ; prothorace oblongo, elytris di-  
midio angustiore, antice tantum et leviter attenuato, basi marginato,  
laxe sat tenuiter punctato, medio linea subimpressa signato et basi im-  
presso ; scutelio dense punctato, paulo depresso, marginibus elevatis ;  
elytris postice ampliatis, apice rotundatis, dense basi fortiter, postice  
subtilius punctatis, sutura et utrinque lineolis 2 leviter elevatis ; subtus  
densissime subtiliter punctato, abdominalis segmentis 2, 3, 4 medio fovea  
sat profunda impressis. — Tonkin.

Ce *Zonitis* est remarquable par ses élytres un peu élargies en arrière  
comme quelques espèces australiennes.

**RINNONCUS PYRRHOPUS** Boh. — Long. 2 1/2 mill. — Breviter ovatus, valde  
convexus, castaneus, prothorace capiteque plus minusve infuscatis, mo-  
dice nitidus, setulis squamosulis albidis parum dense hirtulus, in capite  
densius, macula scutellari albida ovata, antennis pedibusque rufis aut  
rufo-castaneis et his basi dilutioribus, antennarum clava apice infuscata ;  
rostro crasso, vix arcuato, basi leviter angustiore, capite punctato, an-  
tennis sat gracilibus, scapo oculos attingente, clava ovata ; prothorace  
elytris angustiore, transverso, a basi antice angustato, margine postico  
medio obtusissime angulato, dorso grosse, dense ac profunde punctato,  
intervallis angustis rugulosis, linea media obsolete impressa, dorso  
utrinque medio leviter angustato, lateribus paulo densius albido-pilosus ;  
elytis brevibus, medio ampliatis, apice abrupte rotundatis, dorso for-  
titer punctato-striatis, intervallis convexiusculis, rugoso-punctatis, striis  
suturalibus ad scutellum convergentibus ; pygidio fusco, dense punc-

tato; subtus fuscus, albo-setosus, femoribus subelavatis, tarsorum articulo ultimo fusco. — Tonkin (de Beauchêne).

La dispersion de cet insecte est fort curieuse : il se trouve en Californie, en Pensylvanie, dans l'Amur, et le voici au Tonkin.

**ASTYCUS FLAVOVITTATUS** Pasc., Cist. Entom., 1882, 188. — Long. 11 à 13 mill. — Oblongus, convexus, fuscus, squamulis late viridibus, aurichalceis mixtis vestitus, elytris vitta dorsali lata et vitta submarginali apice late confluentibus squamulis auro-viridibus aut aurosis vestitis; capite rostroque dense punctulatis et medio fortiter sulcatis, antennis fuscis, clava oblongo-acuminata, pubescente, opaca ; prothorace longitudo parum latiore, lateribus sat fortiter rotundatis, antice angustiore, dorso sat dense granulato ; elytris ad humeros sat angulatim rotundatis, postice attenuatis, apice breviter productis, dorso fortiter crenato-striatis, sed striis in vittis aurosis minus distinctis et minus punctatis, intervallis 2 primis sat convexis; subtus paulo pallidior, granulis fuscis minutis sperontus, pedibus anticis paulo majoribus. — Tonkin (de Beauchêne).

Ce joli Curculionide est remarquable par sa coloration d'un vert gai, métallique, avec deux bandes d'un vert doré pâle sur chaque élytre ; ces bandes sont parfois d'un roux brillant. Il ressemble assez au *lateralis*, mais le corselet est bien plus fortement arrondi sur les côtés, les élytres ont les épaules plus marquées et leur extrémité forme une courte pointe comme chez les *Chlorophanus*.

**1. CORIGETUS MANDARINUS.** — Long. 5 à 6 mill. — Oblongus, convexus, squamulis minutis pallide viridibus aut fulvido-viridulis dense vestitus ; capite rostroque parce punctatis, hoc medio et lateribus tenuiter carinulato, apice dilatato et late exciso, antennis parum gracilibus, pilosis, pallido setulosis, scapo levissime arcuato, prothoracis marginem paulo superante, funiculi articulis 2 primis elongatis, 2<sup>e</sup> longiore, clava sat acuminata ; prothorace trapeziformi, elytris paulo angustiore, basi profunde et late bisinuato, lobo intermedio triangulari, angulis posticis paulo obtusis, dorso utrinque levissime impresso, punctis denudatis sat dense sparsuto ; scutello minutissimo ; elytris ovatis, ad humeros obliquatis, postice haud ampliatis, apice separatim obtuse angulatis, dorso setulis pallidis subtilibus, brevibus dense vestitis, sat subtiliter striato-punctatis, striis apice profundioribus, intervallis planis, punctis denudatis minutis sparsutis ; subtus cum pedibus similiter vestitus, densius

punctatus, femoribus omnibus modice inflatis, ante apicem subtus emarginatis et denticulo brevi armatis. — Tonkin (Laligant).

La coloration est variable : sur l'un des deux individus elle est d'un vert clair, sur l'autre d'un verdâtre un peu fauve, clair.

Cette espèce ressemble au *sellatocollis* Faust, du Turkestan ; mais le corselet est moins étroit, avec les côtés plus droits, le deuxième article du funicule est un peu, mais distinctement, plus long que le premier, le lobe médian du corselet est plus triangulaire, plus pointu, les angles postérieurs sont plus obtus, l'écusson est plus petit et tous les fémurs sont munis en dessous d'une très petite dent.

2. *CORIGETUS LIMBALIS*. — Long. 40 mill. — Oblongus, sat fortiter convexus, fuscus, squamulis minutis dense vestitus, fere opacus, squalide et fumato-virescens, sutura anguste et corporis lateribus dilute virescentibus ; capite rostroque strigosulis, hoc lato, capite haud angustiore, utrinque subtiliter costulato, apice profunde et acute exciso, antennis fuscis, pallido pilosis, clava acuminata, funiculi articulis 2 primis subæqualibus, scapo leviter arcuato ; prothorace transverso, elytris sensim angustiore, antice angustato, lateribus fere rectis, margine postico utrinque late leviter sinnato, medio rotundato, angulis posticis fere rectis, dorso sat fortiter sat dense punctato ; scutello majore, truncato ; elytris ad humeros sat rotundatis, postice vix ampliatis, dorso substriato-punctatis, striis postice profundioribus, intervallis planis, dense punctato-asperulis, breviter dense fulvo-pubescentibus ; subtus griseo-virescens, sat denso asperulo-punctatus, setosulus, femoribus sat clavatis, subtus apice emarginatis et denticulo minutissimo munitis. — Tonkin.

Ressemble un peu au *C. turkestanicus* Faust, de Fergana, mais plus grand, plus oblong, avec le rostre plus profondément échancré, les antennes plus grêles, le corselet moins rétréci en avant, encore plus faiblement bisinué au bord postérieur, l'écusson plus tronqué et les élytres plus allongées, moins convexes, plus arrondies à l'extrémité ; la coloration est aussi différente.

3. *CORIGETUS IGNARUS* Faust. — Se retrouve aussi au Tonkin (Laligant).

*EUGNATHUS ELEGANS*. — Long. 6 à 8 mill. — Oblongus, valde convexus, brunneo-piceus, squamulis griseis aut fulvo-griseis sparsutus, capite medio densius, prothorace his squamulis densatis trivittato, ely-

tris vitta obliqua, ab humero suturam versus leviter intus arcuata et vitta communi post medium transversa, ad marginem antice dilatata similiter densatis, sutura et vittulis posticalibus interdum pallido-squamulosis; capite punctato, rostro basi medio breviter sulcato, antennis gracilibus, elava fusiformi, elongata, funiculi articulo 1<sup>o</sup> apice crassiore; prothorace elytris fere dimidio angustiore, longitudine vix latiore, medio rotundato-ampliato, basi et apice aequaliter constricto; elytris sat brevibus, ad humeros angulatis, post medium vix ♂, sensim ♀ ampliatis, apice obtuse rotundatis et paulo marginatis, dorso grosse substriato-punctatis, striis postice profundis, intervallis planiusculis; subtus setulis fulvo-griseis crassiusculis dense vestitus, pedibus squamosulis, fulvo-griseo pilosis, pedibus anticis longioribus, femoribus valde clavatis. — Tonkin (de Beauchêne).

**ARHINES FRENATUS.** — Long. 7 à 9 mill. — Oblongus, convexus, fusco-niger, squamulis pallide viridibus dense vestitus, punctis denudatis rarius sparsatus, prothorace vittis 2 latis denudatis signato, elytris pilis nigris longe ac dense hirtis; capite rostroque parcius squamosis, strigosulis, hoc medio carinulato, illo summo punctulato et inter oculos foveolato, his prominulis; antennis gracilibus, piceis, pubescentibus, scapo gracili, apice paulo crassiore, funiculi articulis 2 primis elongatis, aequalibus; prothorace elytris valde angustiore, antice angustato, lateribus postice rotundatis, dorso grosse ac profonde parum dense punctato; elytris oblongis, ad humeros angulatis, post medium angustatis, apice breviter mucronatis, dorso sat subtiliter striato-punctatis, punctis postice obsolescentibus, intervallis planis, punctis piligeris laxe seriatis; subtus virescenti aut fulvescenti-pubescenti, pedibus nitidis, pilosis, femoribus clavatis, anterioribus crassioribus et intus denticulo minuto armatis. — Tonkin (de Beauchêne et Laligant).

Distinct de ses congénères par sa coloration, sa villosité et ses fémurs antérieurs munis en dessous d'un petit denticule.

**CERESIUM LEUCOSTICTUM** White, Catal. Long., II, 245, pl. vi, fig. 4. — Long. 10 1/2 mill. — Elongatum, convexum, fusco-piceum, modice nitidum, griseo-fulvo-pilosum, elytris ad suturam anguste piceo-rufescens; scutello, maculis 2 post scutellum, utrinque medio maculis 3 triangulariter dispositis et ante apicem maculis 2 transversim conjunctis, prothorace utrinque punctis 3 (intermedio fere obsoleto) albido-pubescentibus, antennis pedibusque testaceo-piceis; capite brevi, rugosulo-punctato, inter antennas sulcatulo; antennis corpore paulo longioribus,

sat gracilibus, articulo 1º rugoso, 3º quarto longiore et 5º aequali, articulis 7, 8, 9 leviter sulcatulis; prothorace elytris angustiore, latitudine longiore, antice et basi fere aequaliter angustato, lateribus leviter arcuatis, basi et antice similiter constrictis, dorso fortiter et subtransversim rugoso, costula media longitudinali lœvi, antice præsertim et basi abbreviata punctis lateralibus albis impressis; elytris basi truncatis, ad humeros angulatis, post medium attenuatis, apice truncatis, sed extus rotundatis, basi sat fortiter sat dense punctatis, disco ante medium impressiusculis, a medio postice subtilius punctato-asperulo; pectore et abdominis lateribus albido-punctatis, metapleuris albidis, femoribus clavatis, genubus infuscatis.

L'écusson est couvert d'une fine pubescence blanchâtre, et un peu derrière se trouvent deux points semblables à peine séparés par la suture. Sur le corselet, les deux points latéraux postérieurs sont parfois réunis et forment une courte ligne longitudinale, d'après la description de White.

Cette espèce a été indiquée primitivement de l'Inde orientale; elle a été retrouvée au Tonkin par M. de Beauchêne.

*OLENECAMPTUS COMPRESSIPES.* — Long. 21 mill. — Elongatus, parum convexus, dilute piceo-rufescens, pube subtilissima grisecente vestitus, maculis et vittis ochraceo-flavis dense pubescentibus variegatus; capite antice laxe asperato et fulvido-pubescentis, oculis intus ochraceo-flavo marginatis et postice maculis 2 ochraceo-flavis, summo alutaceo, medio tenuiter sulcatulo, basi utrinque macula minuta simili signato; mandibulis apice fuscis, politis, basi macula simili signatis, labro rufescente; antennis corpore fere dimidio longioribus, piceo-rufescens, apice paulo obscurioribus, articulis 2 primis infuscatis, primis 4 asperatis, 3º valde elongato; prothorace elytris angustiore, latitudine plus dimidio longiore, subcylindrico, ante basin leviter ampliato, basi paulo constricto, dorso transversim subtilissime dense plicatulo, medio linea lœvi, postice impressa, antice lineolis 2 et inter eas macula obsoleta, basi maculis 2 minutis ochraceo-flavis; scutello ochraceo-flavo; elytris parallelis, apice truncatulis, basi utrinque ad suturam vitta longitudinali ante medium attenuata, postice maculis minutis, ante apicem macula oblonga paulo majore indicata, disco medio vittula brevi, versus humerum punctis indicata, postice macula oblonga ochraceo-flavis, et ad marginem externum maculis minutis dense seriatis pallidius flavidis, dorso dense punctatis, punctis apice tantum minoribus; subtus fuscus, similiter pubescens, pectoris et abdominis lateribus vitta sat lata fulvida

ornatis, hac vitta in abdome brunnco maculata; pedibus compressis femoribus laminatis, anterioribus basi abrupte angulatis, tibiis anteriores intus subtiliter denticulatis, apice arcuatis, ceteris paulo longioribus, femoribus intermediis basi abrupte angustatis, posticis rectis. — Cambodge (coll. du Muséum).

Semblé voisin de l'*O. strigosus* Pasc., d'Arou et d'Amboine, à raison du dessin des élytres; mais la conformation des pattes est très remarquable, les taches de la tête et du corselet sont très différentes, ainsi que la coloration du dessous du corps.

1. **HIPPOPSIS TENUEVITTATA.** — Long. 42 mill. — Elongata, postice magis attenuata, magis convexa, fusca, parum nitida, capite postice prothoraceque pube subtili squalide grisea vestitis, hoc vittis 5 angustis dense squalido-griseis, elytris fere denudatis, sutura cum scutello et utrinque vittis 3 dense squalido-griseo vittatis, vitta 4<sup>a</sup> angustissima; capite medio striato, summo lineolis 2 paulo elevatis vase signato, post oculos densius pubescente; antennis gracilibus, corpore duplo longioribus, usque ad medium subtus longe sat dense ciliatis, articulo 4<sup>o</sup> crasso, leviter arcuato, basin prothoracis haud attingente, 3<sup>o</sup> leviter arcuato, 4<sup>o</sup> 5<sup>o</sup>que basi griseo-pubescentibus; prothorace elytris angustiore, latitudine haud longiore, basi leviter constricto, lateribus paulo undulatis, basi obsolete transversim sulcatulo, dorso parce punctato, pube transversim disposita; scutello sat lato, fere truncato; elytris postice angustatis, apice rotundato-truncatis, dorso fortiter sat dense punctatis, punctis postice obsolescentibus; subtus subtiliter cinereo-pubescentis, lateribus densissime pubescentibus et in abdome intus vitta obscura nitidiore comitatis; pedibus brevibus, femoribus sat validis. — Cochinchine (Morice).

Cet insecte ressemble beaucoup à l'*H. quadricollis* Fairm., de Mahé; mais il est plus petit, les élytres sont plus courtes, avec l'extrémité faiblement tronquée, non échancrée; le corselet est un peu plus court, avec les côtés plus ondulés; les 4<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> articles des antennes sont légèrement arqués.

Cette espèce diffère des vrais *Hippopsis* en ce que le lobe inférieur des yeux est plus grand et que le premier article des antennes n'atteint pas la base du corselet. Il en est de même pour la suivante ainsi que pour l'*H. quadricollis*.

2. **HIPPOPSIS TONKINEA.** — Long. 42 mill. — Elongata subparallelia, postice tantum angustata, sat convexa, brunnco, parum nitida, pube

subtili ferruginea rarius obsita, prothorace vittis 5, elytris sutura et utrinque vittis 3 dense ferrugineo-pubescentibus, intervallo tertio medio lineola angusta ferruginea sat breviter signato; capite fortiter punctato, dense ferrugineo-pubescente, summo medio lineolis 2 brevibus, elevatis, nitidis fuscis signato, inter antennas striato; his corpore fere duplo longioribus, gracilibus, subtus usque ad medium sat longe parum dense ciliatis, articulo 1<sup>o</sup> elongato, sed basin prothoracis haud attingente, recto, dense punctulato; prothorace elytris angustiore, fere quadrato, latitudine paulo longiore, lateribus fere rectis, basi transversim fortiter sulcato, dorso sat laxe punctato; scutello fere truncato, punctulo denudato signato; elytris elongatis, post medium attenuatis, apice truncato-sinuatis, sat fortiter sat dense punctatis; subtus dense subtiliter ferrugineo-pubescentes, lateribus densius pubescentibus, pedibus brevibus, femoribus sat crassis. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble assez à la précédente espèce, mais plus étroite, avec les élytres plus longues, à bandes plus roussâtres, la bande externe recouvrant tout le bord marginal, et l'extrémité est assez fortement échancrée; les 1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> articles des antennes ne sont pas arqués; le corselet est moins court, à côtés droits, parallèles.

**TETRAGLENES INSIGNIS** Newm. et **EUGOMATOCERA VITTATA** White. — Ces deux curieux Longicornes, qui se trouvent dans l'Assam et le Laos, ont été rapportés du Tonkin par M. de Beauchêne.

**AORIA NIGRIPES** Baly. — Long. 4 1/2 mill. — Breviter ovata, valde convexa, tota fusco-picea, dense cinereo-pubescentes, parum nitida, antennis piceis, basi rufo-piceis; capite subtiliter punctulato, summo obsolete sulcatulo; prothorace elytris valde angustiore, valde convexo, antice angustato, margine postico medio paulo obtuse lobato, dorso dense punctato; scutello triangulari, acuto; elytris ad humeros angulatis, apice rotundatis, dorso dense punctatis, obsolete lineatis; subtus alutacea, pedibus magis fuscis. — Tonkin (Laligant). Trouvé originairement à Hongkong.

**CHIYSOMELA TONKINEA.** — Long. 7 mill. — Ovata, modice convexa, viridi-aerea, metallica; capite plicatulo, vertice medio sulcato, sutura clypeali sat profunda; prothorace brevi, elytris paulo angustiore, lateribus antice rotundatis, angulis acutis, margine postico utrinque late sinuato, angulis rectis, dorso polito, punctis aliquot postice rarissimis, antice paulo densioribus, lateribus anguste et parum incrassato, intus

punctato-carioso, haud impresso; scutello ovato, basi truncato, laevi; elytris ovatis, medio haud sensim ampliatis, apice modice declivibus et paulo obtuse rotundatis, dorso politis et punctis fere foveatis sat irregulariter geminatim seriatis; subtus cum pedibus fusco-metallescens, metapleuris haud punctatis. — Hanoï (Aubert).

Cette Chrysomèle ressemble à la *C. foreo-punctata* Fairm., du Yunnan; mais elle est moins convexe, un peu moins courte, d'une coloration différente; en outre, le vertex est sillonné au milieu, les côtés du corselet sont moins épais, plus étroits, non déprimés en dedans; chez la *foreo-punctata*, cette dépression forme presque un sillon à la base; les élytres sont moins arrondies, les points des séries sont un peu plus plus petits et plus nombreux. Elle paraît voisine de la *C. Grutii*, de Rangoon; mais cette dernière est d'un cuivreux brillant, le disque du corselet est parsemé de gros points et les lignes de points sur les élytres sont confuses en avant.

**PAROPSIDES NIGRO-SPARSUS.** — Long. 7 à 8 mill. — Breviter ovatus, valde convexus, castaneo-ruber, sat nitidus, prothoracis macula antero-media, postice oblitterata, scutello elytris utrinque maculis sex nigris, 1<sup>a</sup> basali, 2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup>que transversim ante medium, 4<sup>a</sup> 5<sup>a</sup>que ante apicem. interna communi, et 6<sup>a</sup> apicali communi; capite punctulato antice densius, sutura clypeali angulati; antennis prothoracis basin parum superantibus, apice sat clavatis; prothorace valde transverso, longitudine fere triplo latiore, antice paulo angustato, dorso dense punctato, ad latera fortiter ac rugose; scutello polito; elytris sat brevibus, basi truncatis, postice haud sensim ampliatis, apice late rotundatis, dense sat fortiter punctatis, callo humerali laevi; pectore paulo infuscato, lateribus fortiter punctato, abdomine laevi, nitidiore, lateribus fortiter punctato; prosterno inter coxas sat angusto, post coxas dilatato, mesosterno inter coxas brevissimo et arcuatim emarginato; tibiis extus ante apicem sat acute angulatis, unguibus intus basi angulato-lobatis. — Toukin (de Beauchêne).

Cet insecte s'éloigne un peu de ses congénères par la conformation de la poitrine, le mésosternum étant échancre en arc au lieu d'être saillant, et les tibias étant armés, sur leur tranche interne et avant l'extrémité, d'une dent triangulaire assez aiguë. L'appendice des crochets est en forme de lobe angulé. La forme est bien celle du *P. hieroglyphicus*.

Le genre *Paropsides* n'était encore connu que de la Daourie et des environs de Pékin; mais une autre espèce, du Kiukiang, a été récem-

ment décrite par M. Jacoby : *P. nigro-fasciatus*. La coloration est analogue à celle de notre espèce ; l'appendice des crochets est très long.

**ADORIUM SUBHEMISPILERICUM** Guér. — Cette grande espèce, d'un fauve jaunâtre uniforme, avec une tache noire de chaque côté du métasternum et d'autres plus petites sur les côtés de l'abdomen, se trouve à Java. Un individu provenant du Tonkin m'a été donné par M. l'abbé Umhang.

**CNEORANE RUFO-CÆRULEA.** — Long. 4 1/2 à 5 mill. — Ovata, postice leviter ampliata, convexa, nitida, capite prothoraceque rufis, elytris cærulescentibus, antennis fuscis, articulo 1<sup>o</sup> rufo, subtus rufo-castanea, abdomine pedibusque fuscatis, femoribus 4 anticus et posterioribus basi rufo-castaneis ; capite lœvi, inter oculos transversim striato et plagulis 2 paulo transversis, leviter elevatis ; antennis gracilibus, medium corporis paulo superantibus, articulis 3-11 subæqualibus, ultimo acuminato ; prothorace longitudine duplo latiore, elytris paulo angustiore, antice fortiter angustato, lateribus paulo rotundatis, angulis anticus lobato-productis, lobe obtuso et puncto impresso, basi marginata et utrinque subtiliter ac breviter striolata, angulis posticis obtusis sed apice acutiusculis, dorso subtilissime punctulato ; scutello triangulari, apice obtuso, rufo, subtilissime punctulato ; elytris medio paulo ampliatis, dense sat subtiliter lineato-punctatis, humeris convexis, lœvibus intus impressis ; subtus fere lœvis, abdomine dense punctulato. — Tonkin, Lien-Son (de Beau-chêne).

Ressemble beaucoup à la variété bleue du *C. elegans* ; mais plus petit, avec le 3<sup>e</sup> article des antennes égal au 4<sup>e</sup>, le corselet légèrement arrondi sur les côtés et non presque angulé, et les élytres à lignes de points serrées et assez régulières.

**MENIPPUS CANELLINUS.** — Long. 6 1/2 à 9 mill. — Ovatus, convexus, supra testaceo-fulvus, parum nitidus, pube sericea pallide fulva dense vestitus, subtus cum pedibus piceus, pubescens, femorum basi et coxis piceo-rufescentibus, antennis umbrino-fulvis, mandibulis apice nigris, nitidissimis ; capite subtiliter densissime rugulosus punctato, medio sulcato, labro lato, nitidiore ; antennis validiusculis, medium corporis attingentibus, articulo 2<sup>o</sup> breviore, 3<sup>o</sup> 4<sup>o</sup> que æqualibus ; prothorace brevi. longitudine triplo latiore, elytris paulo angustiore, antice angustato ; lateribus arcuatis, angulis anticus acutiusculis, margine postico ante angulos obliquato, his obtusis, dorso densissime subtiliter punctulato ;

punctis majoribus parum dense immixtis, ad latera densioribus, paulo rugosulis, medio oblonge et utrinque oblique leviter impresso; scutello subquadrato, truncato, subtilissime punctulato; elytris ad humeros sat rotundatis, medio vix ampliatis, apice conjunctim rotundatis, dorso densissime subtiliter punctulato, punctis majoribus sat dense immixtis; subtus subtilissime alutaceus, longius pubescens. — Tonkin (de Beau-chêne).

Cet insecte présente les caractères du genre *Menippus*: les cavités cotoïdes antérieures fermées, les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> articles des antennes égaux, les crochets des tarses bifides, un peu inégalement, le repli éipleural un peu concave, ne finissant que vers les trois quarts de la longueur des élytres. Seulement les bords latéraux du corselet ne sont pas ondulés; le prosternum est extrêmement étroit et sépare à peine les hanches antérieures, le mésosternum est presque vertical, le métasternum, très étroit, forme en avant une pointe un peu redressée et mousse; la saillie intercoxale est assez étroite et assez aiguë.

#### HANOIA, nov. gen.

Ce nouveau genre est très voisin du genre *Downesia*; mais il en diffère par la conformation des antennes, qui, au lieu d'être courtes, formées d'articles joints hernétiquement, sont assez allongées et composées d'articles bien distincts, les six premiers à peu près d'égale longueur, les cinq derniers un peu plus longs, le dernier encore plus long, un peu acuminé; en outre, le 3<sup>e</sup> article des tarses est moins longuement bilobé, le 4<sup>e</sup>, plus gros et plus court, dépassant à peine les lobes du 3<sup>e</sup>. Du reste, le facès est le même.

**H. AUBERTI.** — Long. 5 1/2 mill. — Elongata, subparallela, parum convexa, rufa, nitida, elytris, antennis tarsisque cœrulecenti-nigris; capite punctulato, oculis magnis, ovatis; antennis sat gracilibus, subcylindricis, apicem versus vix sensim crassioribus, basin prothoracis superantibus; prothorace quadrato, elytris paulo angustiore, lateribus medio leviter obtuse sinuatis, marginatis, angulis anticis sat rectis, dorso subtiliter laxe punctato, ad latera medio impresso, margine postico medio late rotundato-lobato et depresso, intus transversim sulcatulo; scutello sat minuto; elytris apice conjunctim rotundatis, dorso utrinque tricostatis, costis basi latioribus, 1<sup>a</sup> cum 2<sup>a</sup> coeunte, sutura paulo elevata, intervallis biseriatum fortiter punctatis; subtus dense punctulata, pectore lateribus grosse punctato, pedibus brevibus tarsis latis. — Hanoï (Aubert).

*HISPA FEMORATA*. — Long. 5 mill. — Oblonga, postice leviter ampliata, cœrulea, nitida, prothorace capiteque paulo ænescentibus, pedibus fuscis, femoribus testaceo-rufis, tarsis subtus albido-sericeis; capite inter antennas rugosulo, subopaco, medio sulcatulo, basi transversim depresso, nitido, subtilissime striolato; antennis fuscis, apice cinereo-pubescentibus, gracilibus, articulis 5 ultimis leviter crassioribus, articulo 4° crasso, apice brevissime spinosulo, 3° secundo longiore; prothorace elytris valde angustiore, dorso fortiter punctato, haud spinoso, medio plagula lœviore signato, postice transversim impresso, lateribus utrinque antice spinis 3 elongatis acutissimis, basi conglomératis externa longiore, et ante basin spina gracili multo breviore armatis; elytris fortiter lineato-punctatis, utrinque disco 5-spinosis, spinis erectis, acutis, basi dilatatis, 1<sup>a</sup> basali, paulo minore, extus spinis 3 minoribus, lateribus utrinque spinis 8, alternatim longioribus, humeris trispinosis; subtus nigra, subtiliter albido-sericans. — Tonkin (de Beauchêne).

Parait se rapprocher de l'*H. cyanipennis* Motsch., de Birma, mais cette dernière est un peu plus courte que l'*H. atra*, plus comprimée vers le milieu des élytres, luisante, noire, avec les élytres d'un bleu d'acier, ayant quatre épines sur leur milieu et les pattes d'un roux plus ou moins brunâtre. Ici, la taille est bien plus forte, le corselet et la tête sont d'un bleu très faiblement bronzé, les élytres sont d'un beau bleu, avec des épines plus nombreuses, et les pattes sont d'un brun foncé avec les fémurs d'un roux testacé.

**4. LANGURIA ANALIS**. — Long. 4 à 4 1/2 mill. — Rufo-testacea, elytris cyaneis, nitida, abdomen apice infuscato, genibus infuscatis, tarsis paulo obscurioribus, antennis fuscis, articulis 3 primis rufo-testaceis; capite subtiliter parum dense punctato, antennis ab articulo 7° gradatim latioribus, ultimo apice rotundato, compresso; prothorace longitudine vix latiore, antice paulo ampliato, lateribus postice levissime sinuatis, dorso sat convexo, parum dense punctato, basi transversim sat fortiter impresso; scutello rufo, planato, impunctato; elytris postice leviter attenuatis, apice truncatulis, dorso punctato-substriatis, striis apice extremo oblitteratis, callo humerali sat convexo, intus sulcato, stria suturali profundiore, intervallis lœvibus; subtus punctata, abdomen apice fusco, femoribus plus minusve apice infuscatis, tibiis interdum fumatis. — Tonkin (de Beauchêne).

Ressemble extrêmement à la *E. pulona* Har.; mais cette dernière est bien plus grande (7 1/2 mill.), les élytres sont violettes, les pattes sont d'un brun noirâtre, sauf la base; la massue des antennes est presque

de cinq articles, la ponctuation de la tête et du corselet est très éparses, peu distincte, ce dernier ayant sa plus grande largeur au milieu.

La *L. ruficeps* Crotch, du Japon et de la Chine, présente la même taille et la même coloration générale ; mais les élytres sont d'un bleu noir, les tarses sont enfumées et le dessous du corps est entièrement jaune.

**2. LANGURIA ÆREIPENNIS.** — Long. 7 mill. — Fusco-aenescens, nitida, capite prothoraceque rufis, antennis pedibusque fuscis ; capite subtiliter punctulato, anterius haud abrupte 4-clavatis, clavae articulo 1° sequentibus minore, ultimo praecedenti paulo angustiore, obtuse ovato, compresso ; prothorace paulo transverso, elytris angustiore, lateribus antice leviter arcuatis, postice leviter sinuatis, angulis posticis acutis, dorso sat convexo, laevi, basi sat fortiter transversim impresso et utrinque striola brevi signato ; scutello brevi, plano, laevi ; elytris a medio postice attenuatis, apice obtusis, dorso punctato-substriatis, intervallis subtilissime vix perspicue punctulatis, stria suturali sulcata, humeris haud impressis ; abdomine subtiliter punctato, segmento ultimo fortius, lineis abdominalibus distinctis. — Tonkin (de Beauchêne).

D'après le tableau des *Languria*, cette espèce viendrait se placer entre les *L. atrocyanea* et *picea* : la première noire, avec les élytres d'un bleu noir, des lignes abdominales courtes et les articles des antennes 1 à 7 courts ; la seconde, d'Australie, noire, avec la tête et le corselet d'un noir brunâtre, les lignes abdominales distinctes et les trois derniers articles des antennes élargis.

**3. LANGURIA MICANTIPENNIS.** — Long. 6 1/2 mill. — Sat elongata, postice attenuata, fulvo-testacea, valde nitida, elytris apice præsertim et lateribus leviter aeneo-micantibus, antennis apice et genubus leviter fumatis ; capite subtiliter parum dense punctato ; antennis crassis, apice gradatim clavatis, clava 4-articulata, apice lata, articulo ultimo apice rotundato ; prothorace valde concava, lateribus leviter rotundatis, postice fere rectis, dorso subtilissime vix perspicue punctulato, basi marginato, transversim depresso et utrinque striola brevi signato ; scutello plano, apice subtiliter acuto ; elytris a medio postice attenuatis, apice subtruncato-rotundatis, dorso sat subtiliter lineato-punctatis, linea suturali sulcata, humeris intus haud impressis ; tibiis anticis valde arcuatis. — Tonkin (de Beauchêne).

D'après le tableau de Harold (Mittheil. Münch. Ent. Ver., 1879, 49), cette espèce viendrait se placer près de la *L. Jansoni* Har. ; mais cette

dernière a la massue des antennes brusquement triarticulée, tandis que, ici, elle grossit peu à peu et est composée de quatre articles; la coloration de la *L. Jansoni* est d'un brun marron, avec les pattes d'un roux testacé, et la taille n'est que de 3 1/2 mill. D'ailleurs, chez notre espèce, les tibias antérieurs sont fortement arqués.

**SAULA FUSCICORNIS.** — Long. 3 mill. — *Testaceo-ferruginea*, nitida, capite, prothorace antennisque fuscis, pedibus brunneis, femoribus basi et tibiis apice tarsisque testaceo-ferrugineis, sat longe fulvo-pubescentes; antennis totis fuscis, clava articulis 2 primis ovatis, ultimo compresso, apice obtuse truncato; prothorace valde transverso, lateribus sinuatis, antice tantum arcuatis, angulis anticis deflexis obtusis, posterioribus acutis, dorso lateribus et basi picescente, dense subtilissime punctulato; scutello trianguli, punctato; elytris valde convexis, ad humeros angulatim rotundatis, medio ampliatis, apice conjunctim rotundatis, densissime subtiliter punctulatis, ad humeros sat fortiter impressis, unde callo humerali convexo. — Annam (de Beauchêne).

La coloration des antennes, qui sont entièrement d'un brun foncé, distingue cette espèce des *S. nigripes* et *ferruginea*, auxquelles elle ressemble beaucoup; en outre, elle est plus petite. Elle est aussi plus petite que la *S. japonica*, dont les pattes sont entièrement noires.

**LYCOPERDINA MANDARINEA** Gerst. — Cette espèce est répandue depuis l'Amur et le nord de la Chine jusqu'à Canton et au Tonkin, où elle a été trouvée par M. de Beauchêne.

